

Tableau 1 : Moyenne des captures par piège des adultes de la cicadelle de la pomme de terre (CPT) et de la cicadelle de l'aster (CA) en date du 25 juin 2020.

	2020-05-31 - 2020-06-06		2020-06-07 - 2020-06-13		2020-06-14 - 2020-06-20		2020-06-20 - 2020-06-27	
Région	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA
Bas-Saint-Laurent							<i>nd</i>	<i>nd</i>
Capitale-Nationale	0,1	0	0	0,2	6,8	1,4	63,6	13,3
Chaudière-Appalaches			0	1	4,8	8	51	13,8
Lanaudière	0	0	1	14,5	0,5	3,5	78	15,5
Laurentides	0,5	0	0,5	1	13,5	6,5	<i>nd</i>	<i>nd</i>
Mauricie	0	0	1	0	22	12	28	19,7
Montérégie-Est	0	0	0,5	4	5	4,8	<i>nd</i>	<i>nd</i>
Saguenay-Lac-Saint-Jean					0	0	7,5	3,5
Total général	0,1	0	0,3	2,0	6,9	3,8	55,8	13,7

ND : données non disponibles.

Collaboration : Jean-Philippe Légaré, biologiste-entomologiste (MAPAQ).

Chaque champ est différent, et les données mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre indicatif seulement.

Elles ne sont pas une justification pour nécessairement intervenir contre les cicadelles dans votre région.