



EN BREF :

- L'irrigation est importante pour obtenir des récoltes de qualité. Prioriser l'irrigation dans les plantations qui portent de jeunes fruits en pleine croissance.
- Dommages de vent dans le poivron.
- Aubergine et poivron : début d'apparition de la punaise terne.

IRRIGATION

Les orages de la nuit dernière (27 au 28 juin) ont été assez abondants dans plusieurs régions, ce qui a été bénéfique pour arroser des terres assoiffées par la période de sécheresse prolongée. Les plantations faites sur paillis de plastique auront tout de même besoin d'un suivi régulier pour l'irrigation par le goutte-à-goutte. Les champs qui portent de jeunes fruits sont très exigeants en eau. Une irrigation bien contrôlée, conjuguée à des apports de calcium dans le goutte-à-goutte, permettra d'optimiser la qualité des récoltes en évitant l'apparition de pourriture apicale.

POIVRON : DOMMAGES DE VENT

Les **vents** ont causé des dommages dans plusieurs champs. Dans les nouvelles plantations de **poivron**, le côté de la tige qui fait face aux vents dominants devient beige à brun (voir la photo 1). La marge des jeunes feuilles est brune (voir la photo 2) et les nouvelles feuilles ont une apparence gaufrée (voir les photos 2 et 3).



Photo 1 : dommage dû au vent sur tige de poivron



Photo 2 : dommage dû au vent sur feuille de poivron



Photo 3 : dommage dû au vent sur tête de poivron

AUBERGINE ET POIVRON : SURVEILLENZ LA PUNAISE TERNE

On signale la présence d'adultes de la punaise terne dans des champs d'aubergine et de poivron en Montérégie. Dans la plupart des cas, les seuils de traitements ne sont pas atteints. Mais, les températures élevées et le beau temps prévus pour la fin de semaine peuvent être favorables à l'expansion de l'insecte.

Vous devez surveiller la punaise terne après les coupes de foin, car elle est alors délogée des prairies et est attirée par les champs de poivron et d'aubergine. Elle quitte aussi les fraisières et les framboisières quand les fruits mûrissent. Cet insecte est difficile à observer, car il s'envole rapidement lorsqu'il est dérangé. L'adulte mesure environ 5 mm (1/4 de po). Il est de couleur brunâtre avec un triangle caractéristique sur le dos. Les larves de punaises ressemblent à des pucerons verts qui bougent rapidement.



Seuils d'intervention suggérés

Poivron et aubergine : lorsque vous observez des boutons floraux ou des jeunes fruits tombés au sol **ou** qui jaunissent et brunissent et tombent facilement lorsque vous les touchez **ainsi que** la présence de l'insecte à plusieurs endroits dans le champ.

Le DECIS, le POUNCE et l'ORTHÈNE, homologués dans le poivron contre la pyrale du maïs, contrôleront aussi la punaise terne. Dans l'aubergine, le LAGON et le CYGON sont des insecticides efficaces contre la punaise terne.



LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES LÉGUMES
CHRISTINE VILLENEUVE, agronome - Avertisseuse – solanacées
Centre de services de Saint-Rémi, MAPAQ
118, rue Lemieux, Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
Téléphone : 450 454-2210, poste 231 - Télécopieur : 450 454-7959
Courriel : Christine.Villeneuve@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome et Cindy Ouellet, RAP

© *Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document*
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 08 – solanacées – 28 juin 2007

