



Grandes cultures

Avertissement No 25 – 12 juillet 2013

Explosion Lac-Mégantic – Croix-Rouge

<http://www.croixrouge.ca/faites-un-don/faites-un-don-en-ligne/donnez-au-fonds-explosion-lac-megantic>

Si vous souhaitez donner au fonds Explosion Lac-Mégantic :

Les dons par chèque ou en espèces doivent être envoyés par la poste à l'adresse suivante :

Croix-Rouge canadienne
6, place du Commerce
Verdun (Québec) H3E 1P4

Veuillez indiquer sur votre chèque, ou sur votre enveloppe pour les dons en espèces,
« Fonds Explosion Lac-Mégantic »
afin que votre don soit dirigé adéquatement.

ÉVALUATION DU RISQUE DE LA FUSARIOSE DE L'ÉPI DES CÉRÉALES

Cet avertissement présente une évaluation du niveau de risque d'infection **pour les céréales de printemps**. La floraison des céréales d'automne est terminée dans toutes les zones agroclimatiques du Québec.

Vous êtes concerné par cet avertissement si votre culture de blé est en début de floraison, ou encore si le blé est en épiaison et fleurit dans les prochains jours. Dans le cas de l'orge, il faut surveiller dès l'épiaison puisque le risque d'infection est présent dès la sortie des épis. Si vous envisagez de traiter avec un fongicide pour réprimer la fusariose, il faut faire un traitement au moment où les épis sont dégagés de la gaine en forte proportion dans votre culture.

Dans presque toutes les régions, le risque d'infection est élevé ou très élevé à cause des pluies (sauf dans certaines zones du Bas-Saint-Laurent) et des températures à la hausse pour les prochains jours, amenant une humidité relative élevée.

Le risque d'infection par le champignon qui cause la fusariose de l'épi est étroitement associé aux conditions climatiques qui sont présentes au moment de l'épiaison et de la floraison. Les **bulletins d'information** disponibles sur le site Internet du Réseau d'avertissements phytosanitaires sont utiles pour donner des informations générales pour votre région (<http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.aspx?sid=2392&pid=0&r>). Veuillez vous référer au tableau suivant pour évaluer le niveau de risque général d'infection par le *Fusarium* pour les prochains jours.



Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10^e étage, Québec (Québec) G1R 4X6

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap



Niveau de risque pour la fusariose de l'épi des céréales au Québec					
Régions	Niveau de risque				
	Date de la mi-floraison réelle ou anticipée				
	Vendredi 12 juillet	Samedi 13 juillet	Dimanche 14 juillet	Lundi 15 juillet	Mardi 16 juillet
Grande région de Montréal et zones adjacentes : Montérégie Est et Ouest, Vaudreuil-Dorion, Laval, Lanaudière Sud et Basses-Laurentides	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	Élevé	Moyen
Outaouais	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	Élevé (T.-Élevé) ¹	Moyen (T.-Élevé) ¹
Abitibi	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	Élevé	Moyen (T.-Élevé) ¹
Témiscamingue	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	É-Moyen	Moyen
Centre-du-Québec et Bois-Franc (Drummondville, Victoriaville, etc.)	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	Élevé	Moyen
Estrie	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé
Mauricie	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	É-Moyen	Moyen
Québec, Portneuf, Donnacona, et rive-sud de Québec	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	Élevé	É-Moyen
Charlevoix	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	É-Moyen	Moyen
Chaudière-Appalaches/Beauce	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	Élevé	Moyen
Saguenay- Lac-Saint-Jean	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	Élevé	Moyen
Montmagny et L'Islet	T.-Élevé (Faible) ²	T.-Élevé (Faible) ²	T.-Élevé (Faible) ²	Élevé (Faible) ²	Moyen (Faible) ²
Bas Saint-Laurent : La Pocatière, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Rimouski et Mont-Joli	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible
Témiscouata	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible (Élevé) ¹
Matapedia	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible
Gaspésie (région de Matane et Gaspé)	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	É-Moyen
Gaspésie (Baie-des-Chaleurs)	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	T.-Élevé	Élevé

(1) Le risque d'infection devient élevé ou très élevé dans le cas où il y aurait des précipitations.

(2) Dans les zones où il n'y a pas eu de pluie depuis plus de cinq jours, le risque est faible

Légende (par ordre décroissant du risque d'infection) :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 T-Élevé : Très élevé | 5 M-Faible : Moyen à faible |
| 2 Élevé | 6 Faible |
| 3 É-Moyen : Élevé à moyen | 7 T-Faible Très faible |
| 4 Moyen | 8 - : Données insuffisantes |

Traitements contre la fusariose de l'épi du blé avec un fongicide

Il existe des produits dont l'usage est homologué contre la fusariose de l'épi. Vous pouvez obtenir des informations sur ces produits en consultant le bulletin d'information [No 09](#) du 11 juin 2013.

Vous pouvez également obtenir de l'information pertinente sur les sites de l'ARLA et des compagnies distributrices de ces produits.

Texte rédigé par :

Yves Dion, Martin Lauzon et Sylvie Rioux.

Coordonnées des membres du groupe de travail

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES GRANDES CULTURES

Katia Colton-Gagnon, agronome – Avertisseuse Centre de recherche sur les grains inc. (CÉROM) Tél. : 450 464-2715, poste 242 – Téléc. : 450 464-8767 Courriel : katia.colton-gagnon@cerom.qc.ca	Claude Parent – Co-avertisseur Direction de la phytoprotection, MAPAQ Tél. : 418 380-2100, poste 3862 – Téléc. : 418 380-2181 Courriel : claude.parent@mapaq.gouv.qc.ca
--	--

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Alexandra Tremblay, RAP

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 25 – Grandes cultures – 12 juillet 2013