Grandes cultures
Avertissement No 34 – 30 juillet 2013

ÉVALUATION DU RISQUE DE LA FUSARIOSE DE L'ÉPI DES CÉRÉALES

Cet avis présente une évaluation du risque d'infection pour les céréales de printemps. La grande majorité des semis effectués ce printemps ont déjà atteint et même largement dépassé les stades critiques d'infection et de traitement. **Cet avis est donc le dernier de l'année et il clôture la saison 2013.**

Vous êtes concerné par cet avis si votre culture de blé est en début de floraison ou encore si le blé est en épiaison et fleurira dans les prochains jours. Dans le cas de l'orge, il faut surveiller l'épiaison puisque le risque d'infection est présent dès la sortie des épis. Si vous envisagez de traiter avec un fongicide pour réprimer la fusariose dans votre culture, il faut faire un traitement au moment où une grande proportion des épis sont dégagés de la gaine.

Le risque d'infection par le champignon qui cause la fusariose de l'épi est étroitement associé aux conditions climatiques qui sont présentes au moment de l'épiaison et de la floraison. Les bulletins d'information disponibles sur le site Internet du Réseau d'avertissements phytosanitaires sont utiles pour donner des renseignements généraux pour votre région (http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.aspx?sid=2392&pid=0&r).

Veuillez vous référer au tableau suivant pour évaluer le niveau de risque général d'infection par le *Fusarium* pour aujourd'hui et les prochains jours.

Niveau de risque pour la fusariose de l'épi des céréales au Québec					
Régions	**Niveau de risque**				
	Date de la mi-floraison réelle ou anticipée				
	Mardi 30 juillet	Mercredi 31 juillet	Jeudi 1er août	Vendredi 2 août	Samedi 3 août
Abitibi-Témiscamingue	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé
Charlevoix	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé
Saguenay/Lac-Saint-Jean	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé
L'Islet	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé
Bas-Saint-Laurent : La Pocatière, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Rimouski, Mont-Joli	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé
Témiscouata	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé
Matapédia	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé
Gaspésie (région de Matane et Gaspé)	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé
Gaspésie (Baie-des-Chaleurs)	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé	Élevé

Légende (par ordre décroissant du risque d'infection) :

1	T-Élevé :	Très élevé	5	M-Faible :	Moyen à faible
2	Élevé		6	Faible	
3	É-Moyen. :	Élevé à moyen	7	T-Faible	Très faible
4	Moyen		8	- :	Données insuffisantes

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap

Traitement contre la fusariose de l'épi du blé avec un fongicide

Il existe des produits dont l'usage est homologué contre la fusariose de l'épi. Vous pouvez obtenir de l'information sur ces produits en consultant le bulletin d'information No 09 du 11 juin 2013.

Vous pouvez également obtenir de l'information pertinente sur le site de l'ARLA et des compagnies distributrices de ces produits.

Texte rédigé par :

Yves Dion, Martin Lauzon et Sylvie Rioux.

Coordonnées des membres du groupe de travail

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES GRANDES CULTURES

Katia Colton-Gagnon, agronome – Avertisseure
Centre de recherche sur les grains inc. (CÉROM)
Tél. : 450 464-2715, poste 242 – Téléc. : 450 464-8767
Courriel : katia.colton-gagnon@cerom.qc.ca

Claude Parent – Co-avertisseur
Direction de la phytoprotection, MAPAQ
Tél. : 418 380-2100, poste 3862 – Téléc. : 418 380-2181
Courriel : claude.parent@mapaq.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome et Alexandra Tremblay, RAP

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document :
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 34 – Grandes cultures – 30 juillet 2013