



Bovins laitiers

Élever de meilleures génisses



Par : Chantal Paul
Agriculture et Agroalimentaire Canada
<http://res2.agr.gc.ca/lennoxville>
Révisé le 14 mars 2002

Au Colloque laitier de l'Ouest du Canada de 1998, Mike Hutjens, de l'Université de l'Illinois, a recommandé de suivre ces lignes directrices pour la préparation des rations des génisses :

- Limiter la quantité d'ensilage et l'alimentation au pâturage des génisses de moins de six mois.
- Les génisses de trois à six mois ont besoin de grains d'appoint (de 1 à 3 kg) pour l'énergie et d'un complément protéique (de 0,2 à 0,5 kg).
- Les taures de 12 à 21 mois peuvent ne pas avoir besoin de grains d'appoint ni d'un complément protéique outre ce que fournit le fourrage.
- Les taures de plus de 21 mois peuvent avoir une ration semblable à celle qui est servie aux taures de 12 à 21 mois, à laquelle on ajoute toutefois de plus grandes quantités d'oligo-éléments, de vitamines et d'éléments nutritifs pour le veau à naître.
- Il faut mélanger au fourrage ou au grain un complément équilibré de vitamines et de minéraux dont on « gave » toutes les génisses et les taures (pas de libre choix).
- Il faut donner un ionophore à TOUTES les génisses et à TOUTES les taures.

Hutjens a également insisté sur le fait que les génisses doivent être divisées en sept groupes d'âge pour réduire la concurrence entre elles et pour pouvoir leur donner des rations qui correspondent aux besoins particuliers à chacun des groupes.

[Source : Advances in Dairy Technology, 1998, page 5.](#)