



Le RAP

RÉSEAU D'AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES

Leader en gestion intégrée
des ennemis des cultures

BULLETIN D'INFORMATION | CUCURBITACÉES

N° 2, 8 mai 2019

HERBICIDES HOMOLOGUÉS DANS LES CULTURES DE CUCURBITACÉES EN 2019

Ce bulletin d'information regroupe les herbicides homologués dans les cultures de cucurbitacées, soit les citrouilles, les concombres et les cornichons, les courges d'été (zucchini, etc.), les courges d'hiver (spaghetti, Butternut, Buttercup, Hubbard, poivrée, etc.) et les melons (melon d'eau, melon miel, melon brodé ou cantaloup, etc.).

Pour chacun des herbicides mentionnés, vous y retrouverez :

- Le nom commercial, la matière active, le délai de réentrée et le groupe de résistance. Nous vous suggérons fortement d'alterner les groupes de résistance, dans les situations où cela est possible, afin de diminuer les risques de développement de la résistance des mauvaises herbes à ces produits.
- Les mauvaises herbes inscrites sur l'étiquette du produit.
- Le calcul des indices de risque pour la santé (IRS) et l'environnement (IRE) selon l'Indicateur de risque des pesticides du Québec (IRPeQ), en fonction de la plus forte dose homologuée.
- Les cultures pour lesquelles chaque herbicide est homologué.
- Des remarques comprenant des conditions de succès et des mises en garde.

Le calcul des indices de risque pour la santé et l'environnement à partir de l'IRPeQ dans SAgE Pesticides

Nous vous invitons à tenir compte des IRE et des IRS issus de l'IRPeQ. Ces indices apportent un éclairage utile pour choisir les produits phytosanitaires en nous informant des risques pour l'environnement et la santé liés à leur utilisation. Plus le chiffre est élevé, plus le risque est grand.

SAgE pesticides

SAgE pesticides est un outil d'information qui présente l'ensemble des usages agricoles des pesticides et des risques qui y sont associés. C'est un outil plus complet que le présent bulletin. Il est également conseillé de consulter SAgE pesticides lorsqu'on rencontre un ennemi rare ou peu commun, non inclus dans ce bulletin.

CONNAISSEZ-VOUS LE REGISTRE DE PESTICIDES?

L'OUTIL EN LIGNE PAR EXCELLENCE POUR :

- calculer et suivre l'évolution des risques liés aux pesticides utilisés dans l'entreprise afin de les diminuer
- inscrire les renseignements exigés par le Code de gestion des pesticides et les partager avec votre conseiller agricole



Pour plus de détails sur les différents usages des pesticides agricoles, sur les risques qu'ils représentent pour la santé et l'environnement, et pour accéder au Registre de pesticides, vous êtes invité à consulter [SAgE pesticides](#).

Mises en garde

Utilisez seulement des produits homologués sur vos cultures. Ils doivent toujours être utilisés en conformité avec l'étiquette. Les doses maximales, le nombre maximum de traitements par saison et le délai avant la récolte sont très importants. Le non-respect de ces règles représente une infraction à la loi. Assurez-vous que les herbicides que vous utilisez sont acceptés aux États-Unis, si vous prévoyez y exporter vos récoltes.

Certains herbicides doivent être utilisés avec un surfactant. Il est recommandé de toujours vous référer aux étiquettes des pesticides pour les doses, les modes d'application et les renseignements supplémentaires disponibles sur le site Web de [Santé Canada](#). En aucun cas la présente information ne remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides. Le Réseau d'avertissements phytosanitaires (RAP) décline toute responsabilité relative au non-respect des étiquettes officielles.

Utilisez le bon équipement et assurez-vous que votre pulvérisateur est en bon état et qu'il est bien réglé. Dans le cadre du programme [Action-réglage](#) de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture du MAPAQ, plusieurs personnes sont accréditées pour régler les pulvérisateurs.

Ce bulletin d'information a été rédigé par Isabelle Couture, agronome (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter [l'avertisseur du réseau Cucurbitacées ou le secrétariat du RAP](#). La reproduction de ce document ou de l'une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.

Herbicides homologués dans les cultures de cucurbitacées en 2019

Herbicide (matière active) Délai de réentrée	Mauvaises herbes	IRE ¹	IRS ²	Groupe de résistance	Concombre Cornichon	Citrouille	Courge	Melon	Remarques
Antigraminées et antifeuilles larges appliqués avant la levée des mauvaises herbes									
COMMAND 360 ME (clomazone) Délai de réentrée = 12 h	Chénopode blanc, Abutilon, Échinochloa pied-de-coq	32	6	13	S Transformation	S	S	S	<ul style="list-style-type: none"> Faire une seule application par saison. Ne pas utiliser sur un sol sableux et sur un sol contenant plus de 10 % de matière organique. Éviter d'appliquer si la température est supérieure à 25 °C. Traiter après le semis, mais avant la levée de la culture et des mauvaises herbes. Pour les concombres, les courges et les citrouilles, respecter un délai de 30 jours entre l'application et la récolte, et de 60 jours pour les melons. Une légère décoloration de la culture peut survenir lors de la levée. Ne PAS utiliser sur les cultivars de citrouille d'Halloween et sur certains cultivars de courge d'hiver. Bien vérifier l'étiquette pour connaître les cultivars qui ne doivent pas être traités au risque d'avoir une couleur de fruits inacceptable à la récolte. Rémanence³ : la présence de résidus l'année suivant l'utilisation de cet herbicide permet seulement la plantation du soya, de haricots (blancs, communs ou mange-tout), de maïs (grande culture ou sucré), de pois, de poivrons, de brocolis transplantés, de concombres, de citrouilles, de courges, de pommes de terre et du canola. Prendre connaissance des informations sur l'étiquette concernant les zones tampons à respecter et les mesures à prendre pour atténuer la dérive de la pulvérisation.
DEVRINOL 2-XT (napropamide) Délai de réentrée = 12 h	Graminées Feuilles larges annuelles (voir l'étiquette)	240	49	15	Non	S T (courge asiatique, préplantation incorporé), S	Non		<ul style="list-style-type: none"> Faire une seule application par saison. Utiliser sur des sols contenant moins de 10 % de matière organique. Appliquer la plus faible dose sur sol léger. Appliquer avant la levée des mauvaises herbes, en prélevée de la culture. Une pluie ou une irrigation fournissant assez d'eau pour mouiller le sol jusqu'à une profondeur de 5 à 10 cm dans les 24 à 72 heures après l'application est nécessaire pour assurer l'efficacité maximale du produit. La pulvérisation sur un champ couvert de résidus peut nuire à l'efficacité du désherbage. Rémanence³ : attendre 12 mois après la dernière application avant d'installer une nouvelle culture.

Herbicide (matière active) Délai de réentrée	Mauvaises herbes	IRE ¹	IRS ²	Groupe de résistance	Concombre Cornichon	Citrouille	Courge	Melon	Remarques
DUAL II MAGNUM® (S-métolachlore) Délai de réentrée = 12 h	Suppression : Morelle d'Amérique, Morelle noire, Graminées annuelles Répession : Amarante à racine rouge	57	205	15	S, T	S, T	S, T Courge d'hiver	S, T	<ul style="list-style-type: none"> Faire une seule application par saison. Respecter un délai de 30 jours entre l'application et la récolte. Appliquer avant la levée des mauvaises herbes. Pour les concombres semés, les citrouilles et les courges d'hiver : appliquer en prélevée ou en postlevée de la culture. Ne pas dépasser le stade 2 vraies feuilles de la culture. Pour les transplants : appliquer avant la transplantation ou dans les 48 heures suivant la transplantation, en bande dans les entre-rangs après la pose du paillis de plastique. Une pluie ou de l'irrigation est nécessaire dans les 10 jours suivant l'application. Ne pas appliquer sur des sols sableux de moins de 2 % de matière organique. Le risque de dommages à la culture augmente lorsque les conditions sont fraîches et humides. La culture peut montrer des signes de phytotoxicité (baisse de population, maturité retardée, baisse de rendement).
Antifeuilles larges appliqués avant ou après la levée des mauvaises herbes									
SANDEA (halosulfuron) Délai de réentrée = 12 h	Feuilles larges, souchet (voir l'étiquette)	28	7	2	S, T	S, T	S, T	S, T	<ul style="list-style-type: none"> Peut s'appliquer en prélevée ou en postlevée de la culture (2 à 5 vraies feuilles) avant l'apparition des premières fleurs. Maximum de 2 applications/saison avec un délai minimum de 21 jours entre les deux. Entre l'application et la récolte, respecter un délai de 30 jours pour le concombre, la citrouille, la courge d'hiver et la courgette; 57 jours pour le cantaloup, le melon et le melon d'eau. De fortes pluies après une application peuvent accroître le risque de dommages à la culture. Pour les applications en postlevée des mauvaises herbes, utiliser un surfactant de type non ionique (SNI) ou un concentré à base d'huile pour cultures (CHC). SANDEA risque de retarder la maturité des cultures traitées. Ne pas appliquer l'herbicide si la culture ou les mauvaises herbes ciblées subissent un stress dû à la sécheresse, aux sols saturés d'eau, à une faible fertilité (surtout des niveaux faibles en azote) ou à d'autres conditions de croissance médiocres. Un traitement généralisé de l'herbicide SANDEA par-dessus le paillis de plastique peut entraîner des dommages importants à la culture quand les résidus de la pulvérisation sont concentrés dans le trou de plantation par irrigation ou par une pluie. Rémanence³: très grande, variant entre 8 et 36 mois; consulter l'étiquette.

Herbicide (matière active) Délai de réentrée	Mauvaises herbes	IRE ¹	IRS ²	Groupe de résistance	Concombre Cornichon	Citrouille	Courge	Melon	Remarques
Antigraminées appliqués après la levée des mauvaises herbes									
VENTURE L (fluazifop-P-butyl) Délai de réentrée = 12 h	Graminées annuelles, repousses de maïs, de blé et d'orge, chiendent	9	63	1	S, T	Non	Non	Non	<ul style="list-style-type: none"> Faire une seule application par saison. Herbicide systémique. Respecter un délai de 30 jours entre le traitement et la récolte. Appliquer aux stades 2 à 5 feuilles des graminées annuelles, 2 à 4 feuilles des sétaires glauque et verte, et aux stades 3 à 5 feuilles du chiendent. Ne pas travailler le sol dans les 5 jours qui suivent le traitement. Un délai de 2 heures sans pluie après l'application est nécessaire pour assurer l'efficacité du traitement.
POAST ULTRA (séthoxydime) Délai de réentrée = 12 h	Graminées annuelles, repousses de maïs, de blé et d'orge spontanées, chiendent	1	13	1	S, T	S, T	S, T	Non	<ul style="list-style-type: none"> Faire une seule application par saison. POST ULTRA est un herbicide de contact et systémique. Ne fournit pas de suppression résiduelle des mauvaises herbes. L'adjuvant MERGE MD doit être ajouté lors de chaque application de l'herbicide. Respecter un délai de 30 jours avant la récolte. Appliquer au stade 1 à 6 feuilles des graminées annuelles et au stade 1 à 3 feuilles du chiendent. Un délai d'une heure sans pluie après l'application est nécessaire pour assurer l'efficacité du traitement.
ASSURE II ou YUMA® GL (quizalofop-P-éthyle) Délai de réentrée = 12 h	Graminées annuelles, repousses de maïs, d'avoine et de blé spontanées, chiendent	4	33	1	S, T	S, T	S, T	S, T	<ul style="list-style-type: none"> Faire une seule application par saison quand les cucurbitacées ont entre 2 et 6 feuilles. Herbicide systémique. Toujours utiliser avec un adjuvant (MERGE, SURE-MIX^{md} LI700 ou l'adjuvant LIBERATE, en concentration de 0,5% v/v). Respecter un délai de 30 jours avant la récolte. Appliquer au stade foliaire indiqué sur l'étiquette pour les graminées à supprimer. Un délai d'au moins une heure sans pluie après l'application est nécessaire pour assurer l'efficacité du traitement.

Herbicide (matière active) Délai de réentrée	Mauvaises herbes	IRE ¹	IRS ²	Groupe de résistance	Concombre Cornichon	Citrouille	Courge	Melon	Remarques
Antifeuilles larges appliqués après la levée des mauvaises herbes									
AIM EC (carfentrazone-éthyle) Délai de réentrée = 12 h	Feuilles larges annuelles (voir l'étiquette)	1	6	14	S, T	S, T	S, T	S, T	<ul style="list-style-type: none"> Faire une seule application par saison. Herbicide de contact, à utiliser sur les feuilles larges de moins de 10 cm de hauteur. Toujours utiliser avec un adjuvant (AGRAL 90 ou AG-SURF à raison de 0,25 %vol/vol). Respecter un délai d'une journée entre le traitement et la récolte. S'utilise lorsque les plants sont en place à l'aide d'un pulvérisateur muni d'écrans de réduction de la dérive. Le traitement ne doit pas être effectué dans les 6 à 8 heures suivant l'irrigation ou une précipitation, ou lorsqu'il y a une forte rosée sur la culture. Mise en garde: la culture subira des dommages si la pulvérisation entre en contact avec la tige, les feuilles, les fleurs ou les fruits.
DÉFANANT REGNONE (diquat) Délai de réentrée= 24h	Feuilles larges annuelles	218	90	22	S, T	S, T	S, T	S, T	<ul style="list-style-type: none"> Pour le désherbage entre les rangs uniquement. Herbicide de contact. Délai d'application avant la pluie de 15 minutes. S'utilise lorsque les plants sont en place à l'aide d'un pulvérisateur muni d'écrans de réduction de la dérive. Pour une efficacité optimale sur les feuilles larges, il est essentiel de couvrir complètement le feuillage. L'efficacité du traitement peut être améliorée si l'application se fait par temps nuageux ou juste avant ou pendant la noirceur. En présence de graminées, utiliser GRAMOXONE au lieu du défanant REGNONE.

Herbicide (matière active) Délai de réentrée	Mauvaises herbes	IRE ¹	IRS ²	Groupe de résistance	Concombre Cornichon	Citrouille	Courge	Melon	Remarques
REFLEX (fomésafène) Délai de réentrée = 12 h	Feuilles larges annuelles (voir l'étiquette)	75	82	14	S, T	Non	Non	Non	<ul style="list-style-type: none"> Faire une seule application par saison. Ne pas appliquer l'herbicide liquide REFLEX dans le même champ plus d'une fois tous les 2 ans. Utiliser avec un adjuvant si les mauvaises herbes sont levées. Appliquer entre les rangs seulement en laissant une bande non traitée de 15 cm de part et d'autre du rang. L'herbicide liquide REFLEX peut avoir un effet phytotoxique sur les concombres s'il est appliqué trop près des plants. Il est impératif d'ajuster les doses selon la largeur de la bande et du rang. Appliquer avant la levée de la culture ou juste avant le repiquage des plants de concombre, jusqu'à un maximum de 3-4 feuilles des mauvaises herbes à contrôler. Respecter un délai de 42 jours entre le traitement et la récolte. Un délai de 4 heures sans pluie après l'application est nécessaire pour assurer l'efficacité du traitement. Rémanence³: on recommande un essai biologique avant d'implanter d'autres cultures que le blé, le soya, les haricots et le maïs.
Antigraminées et antifeuilles larges appliqués après la levée des mauvaises herbes									
ROUNDUP et plusieurs autres formulations offertes (glyphosate) 540 grammes d'équivalent acide par litre Délai de réentrée = 12 h	Feuilles larges et graminées	14	38	9	S'applique en présemis, en préplantation ou en postrécolte			<ul style="list-style-type: none"> S'applique en présemis, en préplantation ou en postrécolte. Appliquer sur les mauvaises herbes vivaces ou annuelles en croissance active avant de semer ou de planter. Attendre au moins 3 jours après le traitement avant de travailler la superficie traitée. 	

1. IRE : indice de risque pour l'environnement

2. IRS : indice de risque pour la santé

Les indices de risque sont calculés avec la dose la plus élevée recommandée sur l'étiquette, quel que soit le type de sol ou l'infestation de mauvaises herbes, à moins d'avis contraire.

3. Rémanence : présence, au-delà de la période normale d'activité, de résidus d'herbicide en concentration suffisante pour avoir une action phytotoxique sur certaines cultures, mais insuffisante pour assurer la répression des mauvaises herbes.

Délai de réentrée : cette donnée provient de l'étiquette lorsqu'elle est disponible. Sinon, il s'agit de la donnée provisoire recommandée par l'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ). Plusieurs étiquettes mentionnent « Délais de sécurité », qui est le nouveau terme utilisé.

Application de l'herbicide : S = semis, T = transplantation

ND : donnée non disponible