

Le **RAP**

RÉSEAU D'AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES

Leader en gestion intégrée
des ennemis des cultures

AVERTISSEMENT | LAITUE ET CHICORÉE

N° 1, 16 mai 2019

- Résumé climatique et risques associés.
- Avancement des semis et des plantations.
- Insectes : très peu de punaises ternes et pas encore de vers gris.
- Maladie du sol : aucune rapportée.

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS

Le printemps a été jusqu'à maintenant plus frais et plus pluvieux qu'à la normale. Les températures de jour comme de nuit ont été le plus souvent inférieures aux normales saisonnières. Dans les régions plus fraîches (incluant la Capitale-Nationale), on observe même encore un peu de neige à certains endroits. Peu d'implantations ont été faites avant la fin d'avril; la plupart ont débuté durant la semaine du 6 mai. Malgré quelques gels (davantage dans les régions plus froides) et quelques épisodes venteux, on ne rapporte pas de dommages significatifs sur les transplants.

Les précipitations de la dernière semaine ont été fréquentes et abondantes, plus particulièrement sur le sud de la province (voir la [carte des précipitations](#)). Les semis et les plantations se poursuivent lentement, les sols mettant beaucoup de temps à s'assécher. Le développement des cultures (levée des semis et croissance des transplants) demeure aussi très lent en raison des sols froids. Un manque de coloration (feuillage jaunâtre) relié à la faible disponibilité de l'azote du sol est observé dans plusieurs plantations.

AVANCEMENT DES SEMIS ET DES PLANTATIONS

Les semis et les plantations sont en cours dans toutes les régions. Pour plusieurs producteurs, le calendrier de plantations a été retardé. Les plants ont parfois souffert d'être restés trop longtemps en serre, mais la reprise est bonne. Sous températures fraîches, et avec un peu de soleil, l'impact des bâches devrait être notable dans les semaines à venir. En Montérégie-Ouest, les plantations les plus avancées atteignent 6 feuilles et jusqu'à 8 feuilles lorsqu'elles sont sous bâche.

INSECTES

En Montérégie-Ouest, à peine quelques **punaises ternes** adultes ont été observées jusqu'à maintenant. Les nuits froides n'ont pas favorisé non plus l'activité des **vers gris**. Aucun insecte n'est rapporté dans les autres régions.

MALADIES DE SOL

Aucune maladie n'est observée pour l'instant. Cependant, étant donné que les bâches créent un microclimat plus humide, les parcelles bâchées seront à surveiller pour les maladies dans les prochaines semaines. À noter que les traitements fongicides pour préserver les laitues des maladies de sol doivent être faits au plus tard au stade 10 feuilles des laitues, afin de s'assurer que la pulvérisation atteigne le collet à la base des plants. Les champs qui ont subi des conditions difficiles (excès d'humidité, feuillage endommagé, etc.) seront les plus à risque.

Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche et Carl Dion Laplante, agronome (PRISME), et Mario Leblanc, agronome (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter [les avertisseurs du réseau Laitue et chicorée](#) ou [le secrétariat du RAP](#). La reproduction de ce document ou de l'une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.