

Ravageurs du moment

+ **Œufs de tétranyques rouges** : L'éclosion des œufs est prévue cette semaine dans la région entre le 19 mai pour les secteurs les chauds et le 21 mai pour les secteurs les + froids. Les passages d'huile seront donc à planifier cette semaine. Les applications d'huile pour cibler les œufs de la mite rouge se font au stade pré-bouton rose (toutes les feuilles de l'inflorescence sont déployées et fleurs sont encore regroupées). Passé le stade bouton rose (tous les boutons sont ± détachés et on entrevoit du rose), il faudra diminuer la dose pour éviter des risques de phytotoxicité. Rappel sur les conditions d'application de l'huile :

- Pas de Tt au Captane / Soufre 8 à 10 jrs AVANT et APRÈS une application d'huile.
- **Vent faible (<10km/h)**
- T > 15°C idéalement > 18°C et absence de gel dans les 2 nuits qui suivent le Tt

➔ *Si vous avez déjà réalisé un passage contre la cochenille et que vous devez en faire un second pour la mite rouge, faire votre 2^{ème} passage dans le sens inverse de votre 1^{er} passage.*

➔ *Si vous avez présence uniquement de mites rouges, faire 2 passages dans le sens inverse du 1^{er} !*

+ **Punaise terne** : Il est encore un tantinet trop tôt pour intervenir avec une pyrèthre contre ce ravageur. Le seuil d'intervention est de 3 captures cumulatives / pièges. Vos interventions doivent se faire pendant la période d'activité du ravageur : entre 15 et 18h±, pas de vents, T° > 15. Par contre, avec la présence de ruches dans plusieurs parcelles ou dans les environs + la présence de pissenlits dans les vergers, effectuez cette intervention en fin de journée lorsque les pissenlits seront fermés. Bref, inutile de se précipiter pour faire ce Tt. Souvenez-vous qu'une seule pyrèthre est réalisée avant fleur ! À suivre!

- + **Hoplocampe :** Selon les prévisions météo, nous serons à environ 5% d'émergence des adultes à la fin de cette semaine dans la région. Prévoir l'installation de vos pièges (à la hauteur des yeux) au courant de cette semaine.

Précisions pour les entreprises en régie biologique : La pose des assiettes pour le trappage massif de l'hoplocampe se fait quelques jours avant le tout début de l'ouverture des fleurs... À suivre !

- + **Carpocapse de la pomme :** Dès maintenant que vos passages d'huile sont terminés, il sera possible d'installer vos diffuseurs. En cas de problème de petit carpo, la pose doit se faire au plus tard au bouton rose ! Référez-vous à votre conseiller si vous avez des questions lors de la pose de vos diffuseurs. Pour + de détails sur cette méthode de lutte, consulter [le bulletin sur la confusion sexuelle](#).

SVP toujours installer vos diffuseurs le + haut possible dans l'arbre ! Des diffuseurs installés trop bas nuisent grandement l'efficacité de la méthode.

- + **Mineuse marbrée :** Nous sommes au tout début du vol de ce ravageur à environ 5% des adultes émergés de la 1^{ère} génération dans la région. Bien que dépisté, ce ravageur ne nous apparait pas trop préoccupant depuis les dernières années...

Fertilisation au sol :

Du prébouton rose au début de la fleur, appliquez vos engrais ayant du nitrate d'ammoniaque calcique = 27-0-0). IMPORTANT : Appliquer votre engrais **tout juste avant une pluie**. Suivre les bulletins météo si un changement se présente puisque pour l'instant, aucune pluie à l'horizon pour cette semaine...

Bio : Les applications d'actisol sont également à prévoir. L'appliquer avant une pluie également.