22ème message technique, message du samedi 30 mai 8h

TAVELURE : un non-événement…

Pour les 6 stations de la région, la pluie a débuté hier soir entre près de 20h, vendredi 30 mai. Les quantités de pluie enregistrées varient entre 0.2 et 0.6mm. Pour tous les postes, le calcul du risque d'infection s'est arrêté puisque l'HR est passée sous 85% depuis suffisamment d'heures…

Sur notre parcelle de référence (mcintosh / cepiland), entre nos lectures d'hier matin (vendredi 29 mai) et celles de ce matin (samedi 30 mai), nous notons seulement 20% des sites ayant pris 1 nouvelle feuille. Par contre, un développement foliaire + fulgurant a été noté entre jeudi matin (28 mai) et vendredi matin (29 mai), où nous avons 60% des sites végétatif qui ont pris une nouvelle feuille. Sachez également que les derniers résultats du labo de l'IRDA des échantillons de la région envoyé mercredi dernier nous laissent croire que le pire n'est pas encore passé…

Selon les bulletins météo, la prochaine pluie est prévue pour ce soir vers 15-17h±. Pour le moment, cette pluie n'engendrait pas une infection. À suivre…

Tt insecticide post floral : il est urgent d'attendre !

Si ce n'est déjà fait, il est grand temps de faire sortir les ruches du verger ! Si vous devez intervenir contre l'hoplocampe, suivez bien les prévisions météo. Rappellez vous d'intervenir durant des conditions favorables à l'hoplocampe soit T>15°C (si possible 18-20°C), faibles vents et aussi 24 heures sans pluie. Notez bien qu'il est inutile d'intervenir si vous n'aviez pas le seuil d'intervention… et que le charançon n'est pas de sortie ce soir. En tout état de cause, ne gaspillez pas vos $$, si vous n'avez pas les conditions requises, reportez votre intervention !

Agrimek vs Minecto pro ?

Tel qu'écrit dans un message cette semaine dès le stade calice / nouaison, il sera temps de faire votre Tt Agrimek / Envidor pour les parcelles avec problèmes récurrents d'acariens. Par contre, il semblerait qu'Agrimek soit difficile d'approvisionnement cette saison et qu'il serait remplacé par Minecto Pro. Ce nouveau produit contient en fait la matière active contenue dans l'Agrimek (abamectine) + une matière active (cyantraniliprole) étant du même groupe chimique que l'Altacor utilisé pour lutter contre le carpocapse.

Souvenez-vous que pour freiner l'apparition de résistance du carpocapse, nous faisons une rotation des insecticides utilisés sur la première et deuxième génération du ravageur à chaque année. À titre d'exemple :

	2019	**2020**
1ère génération du carpo	Altacor	Intrepid
2ème génération du carpo	Intrepid	Altacor

Pour les entreprises qui souhaitent utiliser le Minectro Pro cette saison, sachez que vous devrez ajuster vos insecticides utilisés dans la gestion du carpocapse. Dans la situation où Minecto Pro est utilisé ce printemps, le carpocapse sera exposé à une matière active similaire contenue dans l'Altacor pendant sa première génération. Pensez-y !

Enfin, le Minecto Pro doit être appliqué dans les mêmes conditions que l'Agrimek soit en fin de journée par temps couvert et quand la T° > 15°C, HR > 70% et en dilué.