



Répondeur pomicole

Région de l'Estrie

Message #10 mardi 4 mai 2021

ANNONCE : il y aura un webinaire sur l'éclaircissage et la gestion du feu bactérien, ce **jeudi 6 mai à 13h**. Pour y assister, cliquer sur ce [lien TEAMS](#) au moment de l'activité. Aucune inscription nécessaire. Pour voir le programme, [cliquez ici](#).

Les pommiers McIntosh sont au stade pré-bouton rose dans la plupart des secteurs de la région.

* prévisions (^N) Normales	Compton	Stanstead	Lennoxville	St-Germain- Grantham	St-Georges de Windsor	Courcelles
Débourrement avancé	13 avril	14 avril	15 avril	18 avril	15 avril	29 avril
Pré-bouton rose	25 avril	30 avril	29 avril	29 avril	29 avril	10 mai (^N)
Bouton rose	5 mai *	11 mai (^N)	10 mai (^N)	10 mai (^N)	10 mai (^N)	

Tavelure

Il y a des spores matures dans la région, les [résultats d'éjections forcées](#) nous le confirment.

Croissance foliaire : Il y a de nouvelles feuilles depuis les derniers traitements. On compte une moyenne de 1,5 feuille par bouquets entre samedi et lundi.

Les précipitations prévues demain mercredi risquent de causer une infection. Vos options :

- Appliquer un fongicide protectant (Ex. : Polyram, Captan, mancozèbe, Soufre), **en protection** avant la pluie. Assurez-vous de faire cette application le plus près possible de la pluie afin de bien protéger les nouvelles feuilles.
- Appliquer un fongicide protectant (Ex. : Polyram, Captan, mancozèbe, Soufre), en traitement « **stop** », durant ou immédiatement après la pluie, mais avant le début de l'infection.
- Appliquer le bicarbonate de potassium + soufre, en **début de post-infection**, 0 à 250 DH du début de l'infection. Plus de précisions, quant à la période du traitement, seront fournies dans un prochain message.

Suivez les risques d'infection dans votre secteur. Consultez RIMpro [Compton](#), [Stanstead](#) ou [St-Germain de Grantham](#). Tous les sites du réseau pommier sont aussi disponibles via [Agri-réseau](#).



Confusion sexuelle

Une aide financière est disponible pour les diffuseurs de phéromones et pièges Delta, dans le volet 1 du programme [Prime-Vert](#) (mesure 4302), comme pratique visant la réduction des risques liés aux pesticides. Vous devez déposer une demande d'aide financière chaque année. Déposez votre [formulaire de demande d'aide financière](#) et votre soumission à estrie.prime-vert@mapaq.gouv.qc.ca.

Les diffuseurs doivent être installés avant l'émergence des papillons de carpocapse de la pomme. Cette installation se fait plus facilement avant la floraison.

Pour plus d'information, consultez la [fiche 76 du Guide de PFI](#).

Données météorologiques et prévisions

- [Prévisions météo horaires \(Environnement Canada\)](#)
- [Environnement Canada](#) pour les diverses municipalités de l'Estrie
- Météomédia « [Zone verte](#) »
- Pour les secteurs bordant la frontière, [Eye on the sky](#) produit par l'observatoire du Musée Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.

Pour voir venir la pluie :

- [Radar météo de Montpellier, au Vermont](#)
- [Radar météo de Montréal](#)

Bonne journée !

Caroline Turcotte, agronome
Conseillère en horticulture fruitière, MAPAQ
Cell : 819-437-3600
caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca