

On fauche ou pas? Et on coupe quoi?

Par France Bélanger, agr. M. Sc.

La coupe est trop hâtive pour la luzerne quand on ne parvient pas à sentir les boutons floraux de l’apex de la tige.

Une coupe trop hâtive diminue les rendements sans augmenter la qualité et peut nuire au regain et à la persistence.

Le bon stade de coupe de la luzerne est atteint quand on voit les boutons floraux

En une semaine, la luzerne dans un champ a poussé d’environ 5 pouces et est passée du stade début boutons au stade fin boutons-tout début floraison.

Cela nous donne 7 jours de coupe de fourrage de qualité.

Importance de l’année d’implantation

La luzerne des champs implantés l’année passée est moins longue que les luzernières plus âgées et son stade de croissance est moins avancé.

En général, on peut couper les nouvelles implantations à la fin des chantiers de foin.

Le trèfle rouge est plus court que la luzerne.

Il faut aussi le couper en début floraison.

Le Dactyle

Dès l’épiaison, le dactyle perd énormément de qualité fourragère. Il devient excessivement fibreux.

Dactyle: Pleine floraison, début floraison et fin floraison

Prendre la hauteur dans les champs à faucher et dans différents endroits pour un même champ

Photos de la fétuque, stade épiaison complété

Le Brome

Pour le brome des prés, on peut le couper dès son épiaison car c’est une plante adaptée à la paissance.

Pour le brome inerme, il faut attendre de faucher quand il comment à fleurir si on veut en assurer sa persistance.

Le MIL

Il faut attendre le début de l’épiaison avant de faucher pour obtenir le maximum de rendement et de qualité fourragère.