14ème message technique Laurentides, message du samedi 21 mai 2022, 8h

Tts insecticides post-floral

ATTENTION ! Rappelez-vous qu'il est interdit d'effectuer une application d'insecticide durant la floraison ! Dans les secteurs les plus chauds (Ch. Binette / Ch. d'Oka) nous sommes au stade de chute des pétales et pour le reste de la région, l'atteinte de ce stade se fera sous peu ! Appeler votre apiculteur pour faire sortir les ruches de votre verger ! Et si vous avez encore des ruches (ou bien le verger voisin en a encore…) assurez-vous d'appliquer des insecticides avec l'accord de votre apiculteur.

***** TOUJOURS intervenir en dehors des heures de butinage (dès que les pissenlits sont fermés… après 20h± en temps ensoleillé). *****

HOPLOCAMPE : Selon le modèle CIPRA, aujourd'hui samedi 21 mai, nous serons à 50% d'émergence des adultes de ce ravageur. Le seuil d'intervention est de 4 captures cumulatives / pièges. L'hoplocampe est à traiter au **stade chute des pétales** et non pas au stade calice. Il faut y aller variété par variété… Ce Tt sera à faire sous peu ! Viser un 24h sans pluie et des conditions favorables au ravageur (T > 15C, faibles vents).

Pour les entreprises en régie biologique :

--> Si vous avez réalisé le trappage massif : Inutile d'intervenir avec un insecticide contre ce ravageur.

CHARANÇON DE LA PRUNE : De suite après le calice, le charançon cherchera à pondre ses œufs dans les jeunes fruits durant les nuits chaudes et humides. Dame charançon sera prête à pondre prochainement ! Suivez régulièrement son activité sur la page des modèles. Lorsque vous traitez contre le charançon, ce Tt doit être réalisé lorsqu'il est actif, soit de 17h à 22h ±… En début d'activité du charançon, si aucun autre insecte n'est visé, n'intervenir que sur les troncs (0-1.20m) à grandeur de la parcelle. Un traitement réalisé entre 17h et 22h visant l'hoplocampe permettra de contrôler aussi le charançon.

Pour les entreprises en régie biologique : Jusqu'à maintenant, le Surround (Kaolin / argile blanche) est le bio-insecticide le + efficace pour lutter contre ce ravageur. Ce produit permet une barrière physique sur les fruits pour empêcher le charançon d'y pondre. C'est pourquoi des applications répétées sont nécessaires pour bien couvrir le fruit en grossissement. Nous vous tiendrons informés de la prochaine période d'activité afin de positionner vos passages avec de l'argile avant.

TORDEUSE À BANDE OBLIQUES (TBO) : Réaliser un dépistage des larves sur les bouquets de fruits et les pousses (100 observations par parcelle soit 10 observations/arbre sur 10 arbres ou 20 arbres à 5 observations/arbre). *Si 3% des observations présentent une larve, prévoir un Tt.* Intervenir lors d'une période favorable à l'activité des larves (T>15ºC, pas de vent, pas de pluie pendant 24h). Le Tt est à programmer au plus tard une semaine ± après la chute des pétales.

SÉSIE DU CORNOUILLER : Pour les entreprises qui utilisent la confusion sexuelle de la sésie, les diffuseurs sont à installer tout juste avant le début du vol qui est prévu pour la mi-juin. Dose des diffuseurs : 375 diff. / ha à l'intérieur ET 500 diff. / ha en bordure.