

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (MAPAQ)
MESSAGE POMICOLE | MONTÉRÉGIE-EST



Message n° 3 – le vendredi 25 avril 2025

CROISSANCE

Le débourrement est atteint sur tous les sites et le débourrement avancé est atteint pour quelques site ou le sera au cours des prochains jours. Du « vert » est maintenant présent et doit être protégé !

Municipalité	Débourement avancé prévu le	Municipalité	Débourement avancé prévu le	Municipalité	Débourement avancé prévu le
Dunham	25 avril*	Granby	24 avril	Ste-Cécile	24 avril
Farnham	25 avril*	Rougemont	25 avril*	St-Hilaire	26 avril*
Freelighsburg (chemin Garagona)	24 avril	St-Bruno	26 avril*	St-Paul	24 avril
Données obtenues via CIPRA		* Selon les prévisions			



St-Bruno, 25 avril



Freightsburg, 25 avril

TAVELURE:

Aperçu de la situation à venir, selon les prévisions de vendredi 6h

Lieu	Date	Heure approx. début pluie	Heures de mouillure	T moyenne	mm prévus	20mm cumulés prévu le
<u>Dunham, Farnham, Garagona, Granby</u>	Vendredi 25 avril	20h	46.5	8.9	42	26 avril 23h
<u>Rougemont, St-Bruno Ste-Cécile, St-Hilaire St-Paul</u>	Samedi 26 avril	6h	34.5	10.4	14	-

STRATÉGIES D'INTERVENTION : [voir graphiques à la fin](#)

Les conditions seront toutes présentes au cours des prochains jours pour une infection

- Des tissus verts ✓
- Des spores matures ✓
- Période de mouillure ✓

Vos possibilités :

- Un traitement en protection (cuivre = 1 pierre, 2 coups !), qui aura le temps de sécher, le plus près possible avant le début de la pluie pour protéger le feuillage nouvellement apparu (**flèche verte**)
- Intervenir en post-infection avec du bicarbonate de potassium (B2K) avec ou sans soufre (si un traitement à l'huile est prévu) en fin de soirée samedi.

Pour plus d'information, consultez le document « [le bicarbonate et RIMpro](#) »

Du **délavement** (plus de 20mm de pluie, **flèche orange**) est prévu pour les stations du secteur de **Missisquoi**. Vérifier la nécessité d'intervenir de nouveau à l'aide de RIMpro : présence de bâtonnets jaunes (éjections de spores) après le délavement

AVANT d'intervenir avec un pesticide, déterminez quelles parcelles en ont vraiment besoin : antécédents, sensibilité des cultivars, etc. De plus, rappelez-vous que les éjections de nuits sont marginales, ce dont tient compte RIMpro.

Attention aux interactions entre les produits si vous prévoyez faire vos applications d'huile prochainement (captane et soufre).

Selon les derniers résultats des [éjections forcées](#) de spores de tavelure provenant des vergers du réseau **des spores sont matures et prêtes à être éjectées pour tous les sites de la Montérégie**.

Ces résultats seront mis à jour deux fois par semaine en début de saison. Consultez-les fréquemment.

La consultation régulière du [site arbres fruitiers](#) d'Agri-Réseau est aussi fortement recommandée pour suivre **l'évolution régionale des risques de tavelure avec le logiciel RIMpro**.

Contrôle des chancres :

Le plus gros du contrôle se pratique par éradication des branches affectées lors du taillage. Cependant, là où les chancres sont vraiment problématiques un traitement au cuivre est recommandé. Ce traitement est conseillé aussi dans les cas connus de brûlure bactérienne pour diminuer les populations de bactéries présentes sur les chancres. De plus, [le cuivre agit comme premier traitement protectant contre la tavelure](#).

Un traitement de cuivre fixe (oxychlorure de cuivre) peut être fait du stade débourrement jusqu'au stade débourrement avancé en utilisant 450 litres de bouillie à l'hectare ou plus pour bien mouiller le tronc et les fourches. Si le cuivre est appliqué après le stade pré-bouton rose, des risques de roussissement (phytotoxicité) sont possibles. Utiliser un pulvérisateur avec un bon système d'agitation. On peut utiliser un fongicide à base de cuivre comme le Copperspray PM à raison de 3.2 kg/ha. Vous pouvez aussi consulter les fiches [105](#) et [106](#) du guide PFI.

Gestion des insectes et des tétranyques rouges

Si vous prévoyez appliquer de l'huile ce printemps pour contrôler vos populations de psylle du poirier, de cochenille ([fiche 80 du guide PFI](#)) et/ ou de [tétranyques rouges \(fiche 92 du guide PFI\)](#), estimatez vos besoins par un dépistage et faites-en part à votre fournisseur afin que le produit soit disponible lorsque le « bon » moment d'application arrivera :

- Au débourrement pour les cochenilles
- Vers le pré-bouton rose pour les tétranyques rouges (ou avant si de belles conditions météo sont prévues).

Attention certaines conditions doivent être présentes pour s'assurer d'obtenir de bons résultats :

- Température élevée 15-18°C
- Vent faible
- Pas de risque de gel 48h après l'application
- Éviter les matières actives captane et/ou soufre avant et après l'application. Plusieurs étiquettes ont changé dernièrement. Consultez les étiquettes des produits à utiliser pour connaître l'intervalle recommandé.

Bon début de saison !

[Karine Bergeron](#), agronome

Conseillère en pomiculture et viticulture, MAPAQ

Bureau: 1-800-472, 4846, poste 4342

Cellulaire : 819-434-2853

ANNONCES :

- [L'affiche PFI 2025](#) est maintenant disponible en ligne. Vous devriez recevoir votre version papier par la poste prochainement.
- Abonnez-vous gratuitement au [réseau d'avertissements phytosanitaires](#) (RAP) pomme afin de recevoir rapidement les dernières informations concernant la production.
- Les [présentations de la journée horticole pomme 2024 de Saint-Rémi](#) pour lesquelles nous avons une autorisation de publication sont disponibles sur Agri-Réseau

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES ET PRÉVISIONS

- Prévisions météo horaires (Environnement Canada) :


<u>Cowansville</u>	<u>Dunham,</u>	<u>Farnham,</u>	<u>Franklin,</u>	<u>Garagona,</u>
<u>Granby,</u>	<u>Hemmingford,</u>	<u>Henryville,</u>	<u>Marieville</u>	<u>Rougemont,</u>
<u>St-Bruno,</u>	<u>Ste-Cécile,</u>	<u>St-Hilaire,</u>	<u>St-Paul</u>	<u>St-Grégoire</u>

- Environnement Canada pour diverses municipalités
- Pour les secteurs bordant la frontière, [Eye on the sky](#) produit par l'observatoire du Musée Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.
- [Agrométéo](#)

Pour voir venir la pluie :


- [Radar météo de Montpellier, au Vermont](#)
- [Radar météo Environnement Canada](#)

RIMpro





Graphiques RIMpro

Selon les prévisions du moment, vendredi 25 avril 6h
Cuivre en protection vendredi après-midi, avant la pluie



Délavement prévu vers 23h le 26 avril, mais selon les prévisions, très peu d'éjections ensuite (absence de bâtonnets jaunes, réserves de spores matures vide).



Venturia 3.0 - Rougemont Traitements fongicides Rougemont

