



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (MAPAQ)
MESSAGE POMICOLE | CAPITALE-NATIONALE

Message n° 1 – le 25 avril 2025

Bienvenue à une nouvelle saison des messages pommes !

Date prévue de débourrement

Selon les données de CIPRA, en date du 25 avril 2025, il y avait 36 degrés-jour base 5°C d'accumulés à la station de Sainte-Famille. Selon les normales, le débourrement est actuellement prévu pour le 6 mai dans la McIntosh pour les vergers du secteur de l'île d'Orléans.

TAVELURE

Situation des ascospores

Depuis le 9 avril, nous avons débuté l'envoi de feuilles tavelées ayant hiverné dans le verger pilote pour réaliser des éjections forcées à l'IRDA. Contrairement aux autres régions du Québec, les ascospores ne sont pas encore matures pour éjection.

Actions de prévention à réaliser

En ce moment, comme la neige est fondue dans plusieurs vergers, vous pourriez réaliser plusieurs **actions de prévention** d'ici le débourrement. Ces actions sont plus importantes que jamais, en raison de la perte de certains fongicides et des restrictions associées à plusieurs fongicides.

Lorsque vous aurez terminé votre taille, vous pourrez **intervenir au niveau de la litière afin de réduire l'inoculum de tavelure**. En effet, à chaque année, la tavelure envahie les vergers à partir des feuilles mortes retrouvées au sol. Les ascospores présentes dans les feuilles n'attendent que le nouveau feuillage pour envahir vos pommiers. Il faut donc mettre toutes les chances de votre côté et essayer de briser ce cycle.

1) **Broyer autant que possible les feuilles mortes** au moment du déchiquetage du bois de taille. N'oubliez pas les feuilles sous les arbres. Voici une vidéo qui montre comment procéder : [Broyage des feuilles](#)

2) **Appliquer de l'urée au sol par la suite**. On recommande d'appliquer sur les feuilles au sol une solution de 50 kg d'urée par hectare dans un volume d'eau suffisant pour dissoudre l'urée (ex. : 250 L/ha). Vous pouvez réaliser cette application avec votre pulvérisateur à pommier en ouvrant seulement les buses du bas ou en branchant une rampe horizontale (style herbicide) avec des buses qui couvrent toute la largeur de la rangée. L'application de 50 kg/ha d'urée (46-0-0) au stade débourrement donne 23 unités d'azote assez tôt pour que l'arbre en bénéficie au moment opportun. Veuillez noter que certains producteurs de la région utilisent maintenant cette technique depuis plusieurs années et qu'ils ont observé un effet important sur la réduction de la tavelure.

SUIVRE LES INFECTIONS SUR RIMPRO

Pour toute la saison, vous pourrez suivre les infections en cours et celles prévues sur RIMPRO pour la [station de Sainte-Famille](#). Voici un [document](#) qui vous permettra de vous dérouiller pour bien comprendre le modèle avant que les risques d'infection débutent.

À noter qu'il y a des risques d'infection seulement si vos pommiers sont débourrés.

PESTICIDES HOMOLOGUÉS (AUTORISÉS)

L'affiche [Production fruitière intégrée 2025](#) présente les principales recommandations du Comité de PFI et la classification PFI, ainsi que les cotes de toxicité et d'efficacité des pesticides. Veuillez la consulter afin de voir les divers produits homologués.

Pour vous aider dans le choix de vos fongicides, vous pouvez également consulter ce tableau [Caractéristique agronomique principales des fongicides testés pour lutter contre la tavelure du pommier.](#)

Avertissement pour le BLOSSOM PROTECT : Le produit ne sera pas disponible pour la saison 2025, car il y a eu un changement d'usine pour la fabrication. L'ARLA a demandé une nouvelle certification. Pour les pomiculteurs certifiés biologiques, une demande de dérogation a été autorisée par la CARTV sous certaines conditions. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez me contacter pour que je vous fournisse plus de détails.

ÉTALONNAGE DU PULVÉRISATEUR

Pour préparer votre pulvérisateur dans les règles de l'art, [visionnez les capsules vidéo](#) disponibles sur Youtube et consultez la [fiche 61 du guide PFI](#). Vous pouvez également demander l'aide d'un expert qui se trouve dans la [liste des personnes accréditées pour le réglage des pulvérisateurs](#).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Que vous soyez producteur bio ou conventionnel, assurez-vous de bien vous protéger lorsque vous êtes en contact avec les pesticides. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le document «[Protégez vos cultures, protégez votre santé](#)».

PRIME-VERT

Il est encore temps de transmettre votre demande d'aide financière pour la confusion sexuelle du carpocapse de la pomme, pour la confusion sexuelle de la sésie du cornouiller, pour un applicateur de GF-120, ou tout autre équipement admissible dont vous avez besoin. Toutes les demandes d'aide financière et documents nécessaires doivent être transmis à cette adresse courriel : Prime-Vert.2023-2026@mapaq.gouv.qc.ca

Pour plus de détails sur le [programme volet 1.1.1](#).

SUIVI DE VOTRE VERGER POUR LES RAVAGEURS ET LA RÉGIE DE CULTURE

Comme mes messages tout au long de la saison se concentrent sur les informations sur la tavelure et la brûlure bactérienne, si vous avez besoin d'un suivi plus poussé spécifique à votre verger, vous pouvez communiquer avec la conseillère suivante :

Marie-Eve Dion, agr., Conseillère en horticulture, 418-496-0528

Bon début de saison !

Stéphanie Tellier, agr., M.Sc.

Conseillère régionale petits fruits et arbres fruitiers

stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca

Cellulaire : (418) 558-1138

