

# MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (MAPAQ)

## MESSAGE POMICOLE | CAPITALE-NATIONALE

Message n° 18 – le 6 juin 2025


### Stade de développement

Les sites de la région sont actuellement au stade calice dans la McIntosh « Stades-repères du pommier ».

### TAVELURE

Les quelques épisodes de mouillure d'hier n'ont pas engendré d'infection, car le feuillage a eu le temps de sécher avant que les spores de tavelure ne germent.

Actuellement, quelques épisodes de pluie sont annoncés pour samedi, ce qui pourrait engendrer une faible infection. Vous pourrez suivre les infections en cours et déterminer vos stratégies en cliquant sur ce lien : [station de Sainte-Famille](#).



### STRATÉGIES D'INTERVENTION POUR LA PÉRIODE DES INFECTIONS PRIMAIRES

Au cours de la période des infections primaires de tavelure, à chaque infection de tavelure prévue, **4 stratégies d'interventions** sont possibles en fonction des divers fongicides homologués :

- 1) Vous pouvez **intervenir en protection** en appliquant un **fongicide de contact (protectant)** listé dans [ce tableau](#), le plus près possible avant le début de la pluie. **Ce traitement perdra son efficacité à mesure que de nouvelles feuilles apparaissent et que la pluie lessive le produit.**

Veuillez consulter le tableau suivant pour les délais avant récolte ou les délais pour l'éclaircissage, certains produits ne pourrons bientôt plus être utilisés.

| Fongicides                                                           | Dose homologuée   |                                  | Nb max d'applications dans la saison | Délai minimum entre 2 applications | Délai avant récolte | Délai de réentrée           | Délai d'éclaircissage manuel | Lessivage                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Manzate, Dithane, Pencozeb                                           | 6 kg/ha           |                                  | 4                                    | 7 jours                            | 77 jours            | 12 h                        | 35 jours                     | 25 mm                                      |
| MAESTRO 80 WSP ; SUPRA CAPTAN 80 WSP ; SHARDA CAPTAN 48 SC (Captane) | 3 kg/ha ou 5 L/ha | Pommiers semi-nains et standards | 2                                    | 7 jours                            | 19 jours            | 48 h ou 4 jours pour taille | 24 jours                     | 25 mm                                      |
|                                                                      |                   | Pommiers nains                   | 10                                   | 7 jours                            | 15 jours            | 48 h ou 6 jours pour taille | 15 jours                     |                                            |
| FOLPAN (folpet)                                                      | 3 à 3,75 kg/ha    |                                  | 6                                    | 10 jours                           | 24h                 | 24h                         | 6 jours                      | 25 mm                                      |
| COPPER SPRAY 50W (cuivre)                                            | 500 g/ha          |                                  | 16 (8 kg/ha)                         | N/A                                | 2 jours             | 48h                         | N/A                          | 15-20 mm                                   |
| CUEVA (cuivre)                                                       | 5 L/ha            |                                  | 10                                   | 5 à 10 jours                       | 24h                 | 4h                          | N/A                          | 15-20 mm                                   |
| SOUFRE MICROFIN/KUMULUS (soufre)                                     | 5 kg/ha           |                                  | 8                                    | N/A                                | 1 jour              | 24h                         | N/A                          | 15 mm (KUMULUS)<br>10 mm (SOUFRE MICROFIN) |
| B2K (Bicarbonate de potassium)                                       | 4 kg/ha           |                                  | Pas de limites                       | N/A                                | aucun               | aucun                       | N/A                          | N/A                                        |

- 2) Vous pouvez intervenir **pendant la fenêtre de germination des ascospores avant qu'elles infectent le feuillage** ([traitement stop sous la pluie](#)). Pour réaliser ce traitement, vous devez intervenir avec un fongicide de contact (protectant) [listé dans ce tableau](#) lorsque toutes les spores sont éjectées (lignes jaunes), mais avant qu'elles aient commencé à pénétrer dans la feuille (début ligne rouge). Ce traitement ne sera efficace que pour les spores présentes sur le feuillage au moment du traitement.
- 3) Vous pouvez intervenir **avec du bicarbonate de potassium (B2K) seul ou mélangé avec du soufre**. La période d'application optimale se situe entre le début de la ligne rouge (ou sommet du nuage blanc) et lorsque la ligne rouge croise le nuage blanc pour le bicarbonate seul. Cette période est allongée jusqu'au sommet de la zone orange avec le mélange bicarbonate et soufre comme indiquée sur la fiche [le bicarbonate et RIMpro](#).
- 4) Vous pouvez **intervenir en post-infection** en traitant après le début de l'infection avec un fongicide systémique [listé dans ce tableau](#) en vous référant à la colonne DH 100%. Le chiffre indiqué vous précise le nombre de degrés-heures après le début de la pluie jusqu'auquel il est possible d'intervenir avec chaque produit (ex : s'il a fait 10°C pendant la pluie, vous avez 47,1 heures après le début de la pluie pour intervenir avec le FONTELIS).

Chacune des stratégies est expliquée plus en détail dans la [fiche 102](#) du guide pfi.

|                    |                                                                       |                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produit systémique | Degrés-heures (DH) pour une efficacité à 100% après début de la pluie | Produit systémique | Degrés-heures (DH) pour une efficacité à 100% après début de la pluie |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|               |     |          |     |
|---------------|-----|----------|-----|
| CEVYA         | 384 | SCALA    | 450 |
| INSPIRE SUPER | 484 | FLINT    | 427 |
| APROVIA       | 469 | SYLLIT   | 399 |
| FONTELIS      | 471 | ALLEGRO  | 385 |
| SERCADIS      | 398 | PHOSTROL | 235 |


Source : [Tableau fongicides systémiques fiche 48](#)

Par la suite, le renouvellement de votre protection doit se faire en fonction de la croissance des arbres (nombre de nouvelles feuilles déployées), de la quantité de précipitation reçue et de la sensibilité variétale à la tavelure. Pour bien suivre la croissance de vos pommiers, faites des bourgeons témoins. Marquez les feuilles déployées et pliées de certains bourgeons avec un marqueur noir avant chaque traitement. Par la suite, il sera plus facile d'évaluer le nouveau feuillage développé, car celui-ci n'aura pas de marques. Vous pourrez alors mieux évaluer le % de couverture de vos arbres et la nécessité de traiter.

N'oubliez pas également d'installer un pluviomètre dans votre verger afin de déterminer si vos fongicides ont été délavés.

## BRÛLURE BACTÉRIENNE

Les épisodes de mouillure d'hier ont par contre été suffisantes pour déclencher une infection des dernières fleurs ouvertes le 2 et 3 juin.



Si vous aviez encore des fleurs ouvertes, vous pouvez intervenir d'ici la fin de la journée avec de la STREPTOMYCINE 17 afin d'arrêter cette infection. Si vous aviez fait un traitement le 4 ou le 5 juin dernier, vous êtes couvert. Si votre floraison était complètement terminée, vous n'avez aucune intervention à faire.

Surveillez la progression sur le lien suivant [Sainte-Famille](#).

## **Stratégies d'intervention**

Les traitements seront recommandés selon les critères suivants :

Si vous avez eu de la brûlure bactérienne dans votre verger en 2024, il sera important de protéger vos fleurs cette année.

1) Si votre verger était affecté en 2024 (beaucoup d'arbres atteints et de rameaux éradiqués)

Un premier traitement préventif lorsque vous atteindrez entre 50% et 100% floraison et un 2<sup>ème</sup> traitement s'il y a risque d'infection selon le modèle RIMPRO.

2) Si votre verger était peu ou pas affecté en 2024 (quelques arbres atteints ou rameaux éradiqués)

Un traitement ne sera recommandé que s'il y a risque d'infection selon le modèle RIMPRO.

Il est également recommandé d'enlever les fleurs dans les nouvelles plantations des vergers affectés et d'arracher les arbres présentant plusieurs chancres bactériens.

Pour le contrôle de la brûlure bactérienne pendant la floraison, les produits recommandés sont la STREPTOMYCINE 17 WP, la KASUMINE et le BLOSSOM PROTECT.

**Avertissement pour le BLOSSOM PROTECT : Quelques pomiculteurs des autres régions ont finalement réussi à s'en procurer. Vous pourrez toujours faire des appels pour voir s'il y en a encore de disponible.**

Pour la STREPTOMYCINE 17 WP (délai avant récolte pomme 50 jours ; délai avant récolte poire 30 jours) et le KASUMIN (délai avant récolte 90 jours), ces produits doivent être appliqués pendant la floraison car les risques d'infections sont pendant cette période. Ces produits doivent être absorbés par la fleur, donc il ne faut pas les appliquer durant ou juste avant une pluie (ne pas appliquer à moins de 6h avant le début de la pluie). Une fois absorbés, ils protègent toutes les fleurs qui étaient déjà ouvertes au moment du traitement. Ils doivent être appliqués soit de 24 à 48 heures avant une période d'infection (STREPTOMYCINE et KASUMIN) ou jusqu'à un maximum 24 heures après la période d'infection (STREPTOMYCINE). Ils peuvent être mélangés avec la plupart des fongicides, à l'exception des produits très alcalin (B2K) et très acide, ou des formulations EC.

Actuellement, la seule alternative aux antibiotiques qui soit aussi efficace qu'eux est le BLOSSOM PROTECT, une levure antagoniste du feu bactérien. Pour le BLOSSOM PROTECT (aucun délai avant récolte), ce produit doit être appliqué idéalement 24 à 48 heures avant le moment de l'infection, mais au minimum 18 heures avant l'infection afin que les souches de bactéries du produit aient le temps de coloniser les fleurs.

De plus, comme il s'agit d'un champignon, ce produit est **incompatible en mélange** avec la plupart des fongicides, sauf quelques exceptions.

Fongicides **compatibles** en mélange avec BLOSSOM PROTECT

Groupe 3 : Cevya, Kenja

Groupe 7 : Sercadis, Fontelis

Groupe 9 : SCALA, VANGARD

Groupe 11 : Flint

Mélanges : Merivon, Luna Tranquility, Luna Sensation  
Autres: Soufre (ex. : KUMULUS), Phosphonate.

Par contre, tous les fongicides peuvent être utilisés un jour avant ou deux jours après un traitement avec BLOSSOM PROTECT sans nuire à son efficacité. Autrement dit, il faut laisser le BLOSSOM PROTECT s'installer et agir (2 jours) avant d'appliquer un fongicide incompatible.

Dans le cas des engrais et régulateurs utilisés à la floraison, BLOSSOM PROTECT est compatible en mélange avec l'urée et Apogee, mais incompatible avec Solubor.

Lors de l'achat, assurez-vous de vous procurer le BUFFER PROTECT (tampon d'acide citrique) à mélanger avec le produit.

Consultez les fiches PFI [104](#) (sur la biologie), [105](#) (sur le dépistage) et [106](#) (sur les stratégies de lutte et incompatibilités possibles des produits entre eux) (mises à jour en mai 2024).

Cette [capsule vidéo](#) de 8 minutes présente un portrait du ravageur, montre ses caractères distinctifs, identifie les conditions qui influencent son développement, et vous plonge dans l'action du dépistage et des méthodes d'intervention recommandées en production fruitière intégrée. Un outil a également été développé afin de vous aider à prendre les décisions sur les interventions selon les conditions spécifiques à votre verger si jamais vous détectez de la brûlure bactérienne. Vous pouvez y accéder via le lien suivant [Outil décisionnel pour la gestion de la brûlure bactérienne](#).

## PESTICIDES HOMOLOGUÉS (AUTORISÉS)

L'affiche [Production fruitière intégrée 2025](#) présente les principales recommandations du Comité de PFI et la classification PFI, ainsi que les cotes de toxicité et d'efficacité des pesticides. Veuillez la consulter afin de voir les divers produits homologués.

## SUIVI DE VOTRE VERGER POUR LES RAVAGEURS ET LA RÉGIE DE CULTURE

Comme mes messages tout au long de la saison se concentrent sur les informations sur la tavelure et la brûlure bactérienne, si vous avez besoin d'un suivi plus poussé spécifique à votre verger, vous pouvez communiquer avec la conseillère suivante : **Marie-Eve Dion, agr.**, Conseillère en horticulture, 418-496-0528

**Gardez le sourire, nous sommes plus proche de la fin des primaires que du début !**

**Stéphanie Tellier, agr., M.Sc.**

Conseillère régionale petits fruits et arbres fruitiers

[stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca) , Cellulaire : (418) 558-1138

