



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (MAPAQ)
MESSAGE POMICOLE | CAPITALE-NATIONALE

Message n° 26 –mercredi le 26 juin 2025

Stratégies d'été

Nous avons le plaisir de vous annoncer que **les infections primaires sont terminées, nous passons maintenant en stratégies d'été.**

Il est recommandé de maintenir une protection de vos pommiers selon les précipitations prévues, d'ici la fin de la sortie des taches liées aux infections primaires, soit jusqu'au 2 au 6 juillet (10 jours à 14 jours après la dernière infection du 22 juin).

Par la suite, afin de déterminer les traitements à réaliser dans votre verger pour le reste de la saison, il est recommandé de faire un dépistage pour vérifier s'il y a présence de taches de tavelure tel que décrit dans la [fiche 103](#) du guide pfi.

Si des taches de tavelure sont présentes dans votre verger, vous devrez intervenir selon les recommandations dans le tableau suivant avec le (**CAPTAN, MAESTRO ou FOLPAN**) ou selon les spécifications plus loin pour d'autres produits.

Fréquence des taches		Mi-juin à la mi-juillet	Mi-juillet à la mi-août	De la mi-août à la récolte
Très peu fréquentes	1 tache sur 80 feuilles et +	Dose réduite aux 10 jours de pluie	Dose réduite aux 15 jours de pluie	Aucun traitement
Peu fréquentes	1 tache sur 40 feuilles Ou 2 taches sur 75 feuilles et +	Dose réduite au 35 mm de pluie ou pleine dose au 50 mm de pluie	Dose réduite aux 10 jours de pluie	Aucun traitement
Fréquentes	1 tache sur 20 feuilles Ou 2 taches sur 48 feuilles et +	dose réduite au 25 mm de pluie ou pleine dose au 35 mm de pluie	Dose réduite au 35 mm de pluie	Dose réduite au 50 mm de pluie
Très fréquentes	2 taches sur 48 feuilles et -	Dose pleine au 25 mm de pluie	Dose réduite au 25 mm de pluie ou pleine dose au 35 mm de pluie	Dose réduite au 35 mm de pluie

Où selon les stratégies suivantes pour les autres produits :

KUMULUS (soufre) : Prévoyez renouveler ce traitement aux 15 à 20 mm de pluie.


SOUFRE MICROFIN (soufre) : Prévoyez renouveler ce traitement aux 10 à 15 mm de pluie.

COPPER SPRAY 50W ou **CUEVA** (cuivre) : Prévoyez renouveler ce traitement aux 15-20 mm de pluie.

Bicarbonate de potassium seul (B2K) : Lorsqu'il y aura de la pluie, entre 140 et 300 DH après le début de la pluie (si votre nombre d'applications maximales de soufre est atteint).

Bicarbonate de potassium (B2K) + **soufre** : Lorsqu'il y aura de la pluie, entre 140 et 400 DH après le début de la pluie. Le bicarbonate aura également un effet sur le blanc et la suie-moucheture.

Vous pouvez utiliser l'onglet **infections secondaires** dans RIMPRO [station de Sainte-Famille](#) pour vous aider à positionner le traitement. Il doit être fait entre le risque léger et élevé des infections sur feuilles.



Assurez-vous de respecter le nombre maximal de traitements autorisés par produits, les délais avant récolte, les délais pour réaliser certaines tâches. Ces détails sont présentés dans le tableau suivant :

Fongicides	Dose homologuée	Nb max d'applications dans la saison	Délai minimum entre 2 applications	Délai avant récolte	Délai de réentrée	Délai d'éclaircissage manuel	Lessivage	À faire attention ou à noter !
MAESTRO 80 WSP ; SUPRA CAPTAN 80 WSP ; SHARDA CAPTAN 48 SC (Captane)	3 kg/ha ou 5 L/ha	Pommiers semi-nains et standards	2	7 jours	19 jours	48 h ou 4 jours pour taille	24 jours	25 mm
		Pommiers nains	10	7 jours	15 jours	48 h ou 6 jours pour taille		
FOLPAN (folpet)	3 à 3,75 kg/ha	6	10 jours	24h	24h	6 jours	25 mm	Comme le Captane, le Folpan est associé à différents problèmes de roussissement. Le folpet a été discontinué aux USA notamment à cause de ses effets sur la santé humaine.
COPPER SPRAY 50W (cuivre)	500 g/ha	16 (8 kg/ha)	N/A	2 jours	48h	N/A	15-20 mm	Attendre 45 jours après la floraison avant d'utiliser ce produit. Les jeunes fruits sont très sensibles à l'application du cuivre tant qu'il y a de la division cellulaire. Le cuivre peut être phytotoxique sous certaines conditions (séchage lent).
CUEVA (cuivre)	5 L/ha	10	5 à 10 jours	24h	4h	N/A	15-20 mm	Attendre 45 jours après la floraison avant d'utiliser ce produit. Les jeunes fruits sont très sensibles à l'application du cuivre tant qu'il y a de la division cellulaire. Le cuivre peut être phytotoxique sous certaines conditions (séchage lent).
SOUFRE MICROFIN/KUMULUS (soufre)	5 kg/ha	8	N/A	1 jour	24h	N/A	15-20 mm (KUMULUS) 10-15 mm (SOUFRE MICROFIN)	Phytotoxicité par temps ensoleillé et chaud.
B2K (Bicarbonate de potassium)	4 kg/ha	Pas de limites	N/A	aucun	aucun	N/A	N/A	Vous pouvez intervenir lorsqu'il y aura de la pluie avec du bicarbonate de potassium seul (B2K), entre 140 et 300 DH après le début de la pluie (si votre nombre d'application maximale de soufre est atteint) ou avec du bicarbonate de potassium (B2K) et du soufre, entre 140 et 400 DH après le début de la pluie. Ces traitements auront également un effet sur le blanc et la suie-moucheture.
ALLEGRO 500 DF	1 L/ha	5	7 à 14 jours	28 jours	24 h	3 jours	25 mm	Ne pas faire plus de 3 applications successives sans alterner avec un autre fongicide. Réprime les tétranyques et les écoxyphides du pommier. Ne pas appliquer de produit à base de fluazinam dans un même champ 2 années consécutives.

Tableau : Marie-Ève Dion et Stéphanie Tellier

Suivi de résistance aux fongicides

Si votre verger présente des taches de tavelure et que vous suspectez de la résistance, l'IRDA vous offre la possibilité de tester l'efficacité des fongicides contre la population de tavelure présente dans votre verger.

Dans les vergers où des taches de tavelure sont apparentes, il est possible de tester l'efficacité des fongicides contre la population de tavelure présente localement. La procédure à suivre est simple : écrivez à louis.desrochers@irda.qc.ca pour l'aviser qu'un échantillon de feuilles sera acheminé.

1) Avant le 30 juin = Ramassez dans un sac de papier un minimum de 15 feuilles de pommiers **TRÈS tavelées** dans le bloc de verger à tester. Les feuilles doivent être cueillies et expédiées (à vos frais) le même jour par courrier rapide à l'IRDA à Saint-Bruno-de-Montarville. Les sacs avec des feuilles séchées, non tavelées, pas assez nombreuses, ne seront pas utilisés.

2) Entre le 1er octobre et le 15 octobre (après les chaleurs mais sans dépasser le 15 octobre = Ramassez dans un sac de papier un minimum de 15 feuilles de pommiers **TRÈS tavelées** dans le bloc de verger à tester. Les feuilles doivent être cueillies et expédiées (à vos frais) le même jour par courrier rapide à l'IRDA à Saint-Bruno-de-Montarville. Les sacs avec des feuilles séchées, non tavelées, pas assez nombreuses, ne seront pas utilisés.

Les analyses seront faites en décembre 2025 ou janvier 2026 pour la première série et en février 2026 pour la deuxième.
Les résultats seront transmis aux producteurs participants à la fin février 2026.

SUIVI DE VOTRE VERGER POUR LES RAVAGEURS ET LA RÉGIE DE CULTURE

Comme ce message se concentre sur les informations sur la tavelure et la brûlure bactérienne, si vous avez besoin d'un suivi plus poussé spécifique à votre verger, vous pouvez communiquer avec la conseillère suivante :

Marie-Eve Dion, agr., Conseillère en horticulture, 418-496-0528

Bonne suite de saison !

Stéphanie Tellier, agr., M.Sc.

Conseillère régionale petits fruits et arbres fruitiers

stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca,

Cellulaire : (418) 558-1138

