



Message #8 – mardi 5 mai 2026

Tavelure

Mise à jour de la situation

Une infection extrême est en cours pour toutes les stations en Estrie. Le tableau ci-dessous vous résume les informations à tenir en compte pour le niveau d'infection.

	Début de la pluie	Heures de mouillure	T moy (°C)	Pluie (mm)	Niveau d'infection	Traitement stop	Heure limite pour le B2K-S
Compton	5 mai, 14h30	18.5	11.2	38.2	Extrême		6 mai 1h au 7 mai à 2h
Lawrenceville	5 mai, 14h30	43,5	8,9	55	Extrême		6 mai 2h au 7 mai à 2h
Lennoxville	5 mai, 8h30	19.5	11.7	34.5	Important		6 mai 2h au 7 mai à 2h
St-Georges Windsor	5 mai, 9h30	18.5	11.1	36.7	Important		6 mai 2h au 7 mai à 2h
St-Germain Grantham	5 mai, 14h30	35.5	8.3	18	Extrême		6 mai 2h au 7 mai à 2h
Stanstead	5 mai, 14h30	18.5	11.1	39	Important		6 mai 2h au 7 mai à 2h
Stratford	5 mai, 14h30	40,5	8,1	54	Important		6 mai 2h au 7 mai à 2h

*Information provenant de Rimpro, Agropomme et Cipra selon les stations.


Stratégies d'intervention

Vos pommiers sont protégés si vous avez fait:

- Un traitement en protection (p. ex. : captan, mancozèbe, soufre) a été fait lundi soir ou mardi matin et s'il a eu le temps de sécher sur le feuillage, jusqu'à concurrence de 25 mm de pluie pour les fongicides synthèse.
- Surveillez votre pluviomètre pour savoir si vous devez renouveler la couverture fongicide pour cette infection (soufre 10 mm, cuivre 20 mm, fongicides de synthèse 25 mm).
- Pour la plupart des stations, le lessivage est prévu vers midi.

Si vos pommiers ne sont pas protégés, voici vos options :


- Une application de bicarbonate de potassium et de soufre pourrait être réalisée selon les heures indiquées dans le tableau plus haut. Il est préférable d'attendre que la majorité des spores sont éjectés, dans le cas présent, une application en fin après-midi/début de soir serait idéal. Le graphique ci-dessous illustre la meilleure fenêtre d'intervention pour la station de Compton :



- Un traitement « stop » pourrait être fait demain soir, le 6 mai.
- L'application d'un fongicide systémique en post-infection sur feuillage sec dans la journée du jeudi le 7 mai. Consulter la page 2 de [ce tableau](#) pour connaître le nombre de degrés-heures à respecter pour chacun des produits.

Si votre traitement remonte avant la pluie et qu'il est lessivé :

- Un traitement de B2K-S pourrait être fait jeudi le 7 mai toute la journée, soit environ à partir de 140 DH à partir du moment du lessivage.
- Un traitement « stop » pourrait être fait demain soir, le 6 mai comme sur l'image suivante.



RAPPEL

Prévoyez un intervalle de 10 à 14 jours avant ou après une application de soufre, Captan ou Folpan et une application d'huile.

Choix des pesticides

Tous les renseignements (dose, délais de sécurité, délais de récolte, indices de risques IRS et IRE) se trouvent dans la fiche [PFI 2026](#).

→ Priorisez des produits avec des indices IRS et IRE faibles.

Calibration du pulvérisateur

Assurez-vous que votre pulvérisateur est en ordre et bien calibré. La [fiche 61](#) du Guide PFI peut vous être utile.

La liste des personnes accréditées pour faire cette calibration se trouve sur [Action-Réglage](#), dont François Gendron du Club Agroenvironnemental de l'Estrie.

Prenez le temps de visionner les étapes nécessaires à la préparation de votre pulvérisateur : [Réglage des pulvérisateurs](#), [préparation du pulvérisateur](#), [données requises](#), [atteindre la cible \(débit, espacement, vitesse\)](#), [atteindre la cible \(quantité et traitement\)](#).

Des outils indispensables

- Plusieurs liens indispensables se trouvent sur la page d'accueil de la [section Arbres fruitiers](#) d'Agri-Réseau
- Préparez vos EPI : [Protégez vos cultures, protégez votre santé](#)
- Guide PFI - Le guide de production fruitière intégrée est disponible via [la plate-forme du Réseau pommier](#).
- Affiche de Production fruitière intégrée 2026 - Vous pouvez la télécharger [ici](#).
- Agrométéo- Sur le site www.agrometeo.org vous avez accès aux [modèles bioclimatiques](#) des insectes et des stades phénologiques de la pomme. Assurez-vous de sélectionner la station météo correspondant le mieux à votre site.
- Réseau d'avertissement phytosanitaire (RAP) - abonnez-vous gratuitement au [RAP – pomme](#)
- [SAgE pesticides](#) : pour connaître les traitements homologués, calculer les indices de risques (IRE et IRS) ou pour avoir accès au registre IRPeQ.
- Pour suivre les résultats des éjections forcées et connaître la quantité de spores matures prêtes à être éjectées (voir [Éjections forcées vergers pilotes](#)).
-

Données météorologiques et prévisions

- **Spot Wx** : <https://spotwx.com/>
- [Prévisions météo horaires \(Environnement Canada\)](#)

- [Environnement Canada](#) pour les diverses municipalités de l'Estrie
- [Météomédia](#)
- Pour les secteurs bordant la frontière, [Eye on the sky](#) produit par l'observatoire du Musée Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.

Pour voir venir la pluie :

- [Radar météo de Berlin, au New Hampshire](#)
- [Radar météo de Météomedia](#)

Maggie Bolduc, agronome

Club agroenvironnemental de l'Estrie