



Message #17 – vendredi 29 mai 2026

Tavelure

Mise à jour de la situation

De la pluie a débuté hier en après-midi et en soirée pour tous les secteurs. Elle se poursuivra jusqu'à tard aujourd'hui ou demain matin. Ces précipitations provoqueront une infection moyenne à importante. Depuis le dernier traitement, une croissance foliaire importante s'est produite; vos arbres ne sont donc plus protégés si aucune intervention n'a été faite avant la pluie.

Le tableau ci-dessous résume les informations à prendre en compte concernant le niveau d'infection.

	Début de la pluie	Heures de mouillure	T moy (°C)	Pluie (mm)	Niveau d'infection	Heure limite pour le B2K-S
Compton	28 mai, 15h30	28.5	10.1	47.8	Moyen	29 mai 7h au 30 mai 0h
Lawrenceville	28 mai, 15h30	35.5	9.4	46	Important	29 mai 4h au 30 mai à 1h
Lennoxville	28 mai, 20h30	26.5	10.1	46.5	Moyen	29 mai 9h au 30 mai 7h
St-Georges Windsor	28 mai, 20h30	26.5	9.6	46.7	Moyen	29 mai 10h au 30 mai 9h
St-Germain Grantham	28 mai, 21h30	19.5	10.6	40.3	Moyen	29 mai 9h à 30 mai 7h
Stanstead	28 mai, 15h30	31.5	10.1	49.2	Important	29 mai 3h à 30 mai 0h
Stratford	28 mai, 14h30	36,5	9.1	46	Important	29 mai 12h au 30 mai à 14h

*Information provenant de Rimpro, Agropomme et Cipra selon les stations.

Pour connaître les risques d'infection dans votre secteur, consultez RIMpro [Compton](#), [Roxton-Pond](#), [Stanstead](#), [Stratford](#) ou [St-Germain-de-Grantham](#). Tous les sites sont également accessibles via [Agri-Réseau](#).

Les résultats des éjections forcées indiquent qu'il y a des spores matures prêtes à être éjectées (voir [Éjections forcées vergers pilotes](#)).

Stratégies d'intervention

Vos pommiers sont protégés si :


- Un traitement protecteur (p. ex. : captane, mancozèbe, soufre) a été appliqué avant la pluie, jeudi 28 mai. Le produit doit avoir eu le temps de sécher avant le début de la pluie pour être efficace. Surveiller votre pluviomètre pour savoir si vous devez renouveler la couverture fongicide pour cette infection (soufre 10 mm, cuivre 20 mm, fongicides de synthèse 25 mm).

Pendant et après la pluie, voici vos options :

- Une application de bicarbonate de potassium + soufre peut être réalisée selon les heures indiquées dans le tableau ci-dessus. L'ajout du soufre est fortement recommandé. **ATTENTION** : Il est préférable d'attendre que la majorité des spores aient été éjectées.
- L'application d'un fongicide systémique en post-infection peut être effectuée sur feuillage sec durant la journée du samedi 30 mai. Consultez la page 2 de [ce tableau](#) pour connaître le nombre de degrés-heures à respecter pour chacun des produits.

Feu bactérien

La période de floraison s'allonge cependant les températures froides nous sont favorables. Selon les prévisions actuelles de Rimpro, **aucun risque d'infection** n'est prévu pour le prochain évènement d'humidité, **sauf le secteur de St-Germain-de-Grantham**. Une infection est en cours pour les fleurs ouvertes le lundi 25 mai. Un risque est aussi prévu pour la rosée prévue dans la nuit du 30 au 31 mai pour les fleurs ouvertes le mardi 26 mai.



Suivez les risques d'infection de brûlure bactérienne sur RIMpro [Compton](#), [Roxton-pond](#), [Sherbrooke](#), [Stanstead](#), [St-Germain-de-Grantham](#) et [Stratford](#).

Engrais foliaire

N'oubliez pas de faire vos applications foliaires d'azote et de bore au stade bouton rose. Voir le [calendrier de fertilisation foliaire des pommiers](#) et cette fiche du Guide de PFI : [La fertilisation, sans nuire à la phytoprotection](#).

Choix des pesticides

Tous les renseignements (dose, délais de sécurité, délais avant récolte, indices de risque IRS et IRE) se trouvent dans la fiche [PFI 2026](#).

→ Privilégiez les produits présentant de faibles indices IRS et IRE.

Des outils indispensables

- Plusieurs liens indispensables se trouvent sur la page d'accueil de la [section Arbres fruitiers](#) d'Agri-Réseau
- Préparez vos EPI : [Protégez vos cultures, protégez votre santé](#)
- Guide PFI - Le guide de production fruitière intégrée est disponible via [la plate-forme du Réseau pommier](#).
- Affiche de Production fruitière intégrée 2026 - Vous pouvez la télécharger [ici](#) .
- Agrométéo- Sur le site www.agrometeo.org vous avez accès aux [modèles bioclimatiques](#) des insectes et des stades phénologiques de la pomme. Assurez-vous de sélectionner la station météo correspondant le mieux à votre site.
- Réseau d'avertissement phytosanitaire (RAP) - abonnez-vous gratuitement au [RAP – pomme](#)
- [SAGÉ pesticides](#) : pour connaître les traitements homologués, calculer les indices de risques (IRE et IRS) ou pour avoir accès au registre IRPeQ.
- Pour suivre les résultats des éjections forcées et connaître la quantité de spores matures prêtes à être éjectées (voir [Éjections forcées vergers pilotes](#)).

Données météorologiques et prévisions

- **Spot Wx** : <https://spotwx.com/>
- [Prévisions météo horaires \(Environnement Canada\)](#)
- [Environnement Canada](#) pour les diverses municipalités de l'Estrie

- [Météomédia](#)
- Pour les secteurs bordant la frontière, [Eye on the sky](#) produit par l'observatoire du Musée Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.

Pour voir venir la pluie :

- [Radar météo de Berlin, au New Hampshire](#)
- [Radar météo de Météomédia](#)

Maggie Bolduc, agronome

Club agroenvironnemental de l'Estrie