

18e message technique, message du samedi 30 mai 2026, 8h

TAVELURE

Risques météorologiques d'infection

La pluie a commencé dans la journée de vendredi, vers 11h pour les stations Oka et STJ, vers 14h pour les stations Oka Ste-Sophie, St-Benoît et STJ Montée et vers 17h seulement pour STJ640. Voici les données pour chaque station en date de 6h ce matin :

Station	Heures de Mouillure	T moyenne	Cumul de pluie	Risque atteint
Oka Ste Sophie	12h	10.1°C	20.4mm	RI Minimal
Oka	15h	10.4°C	20.0mm	RI Léger
St Benoît Mirabel	12h	10.5°C	14.4mm	RI Minimal
STJ640	10h	9.9°C	18.6mm	RI Minimal
STJ Montée	13h	9.5°C	16.4mm	RI Minimal
STJ	13h	10.1°C	19.2mm	RI Léger

Développement foliaire

Sur la parcelle de référence, 10% des bouquets ont développé une nouvelle feuille dans la journée de jeudi et un autre 10% ont développé une feuille dans la journée de vendredi. Aucune nouvelle feuille ne s'est développée dans les 2 dernières nuits.

Lessivage

Pour toutes les stations, le lessivage du soufre a été atteint vers 23h-minuit.

Pour toutes les stations à l'exception de St-Benoît, le lessivage du cuivre a été atteint entre minuit et 2h.

Pour les stations Oka Ste-Sophie et Oka, le lessivage des fongicides de contact conventionnel a été atteint vers 3-4h du matin.

Maturité des ascospores

Nous sommes dans la période des éjections massives. Le projetable est important.

ANALYSE

Nous retenons 2 cas de figure :

- **1^{er} cas de figure : Vous êtes intervenus dans la journée de jeudi ou vendredi matin avec un fongicide de contact sur feuillage sec qui a été lessivé.** Vous n'êtes plus protégés pour le RI en cours. Selon les prévisions actuelles, le séchage devrait toutefois être atteint vers 7h au risque Aucun. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de réintervenir, mais vous êtes sans protection pour la suite des événements. Renouvelez votre protection avant les risques de pluie prévus pour demain pm.
- **2^e cas de figure : Vous êtes intervenus dans la journée de jeudi ou vendredi matin avec un fongicide de contact sur feuillage sec qui n'a pas encore été lessivé.** Vous être protégés jusqu'à concurrence d'un développement foliaire ou d'un lessivage.

Fongicides pour la tavelure

Pour les entreprises qui souhaitent utiliser le cuivre : Pour éviter les risques de phytotoxicité (roussissement sur fruits, tache sur feuillage...), appliquer le cuivre dans des conditions de **séchage rapide**, éviter de l'**appliquer lorsque les T° > 25°C** et toujours l'utiliser sur **feuillage sec**. Éviter donc les matins avec de forte rosée et en fin de journée lorsque l'HR augmente et que les T° diminuent...

Enfin, petit rappel que le délai avant récolte des produits à base de mancozèbe est de 77 jrs. Pour les variétés hâtives, il est temps d'arrêter.