

37^e message technique, message du lundi 20 juillet 2026, 13h

Ravageurs du moment

➤ **Sésie du cornouiller**

Rappel que pour les entreprises ayant atteint le seuil d'intervention, votre 2^e traitement contre la sésie est à faire 10-14 jours après votre première intervention si ce n'est pas déjà fait. Ouvrir et orienter 1 ou 2 buses à gros débit de chaque côté du pulvérisateur afin de viser le point de greffe uniquement. Si votre point de greffe n'est pas dégagé, le produit ne se rendra pas et votre traitement sera donc inutile.

➤ **TBO**

En date d'aujourd'hui, peu de parcelles ont atteint le seuil d'intervention lors du dépistage d'été. Sa présence s'est néanmoins fait sentir dans les jeunes plantations. La ponte se poursuivant jusqu'à fin juillet, gardez l'œil ouvert pour des dommages frais ou des larves actives.

➤ **Puceron vert et cicadelle**

Ces ravageurs ont justifié une intervention dans plusieurs jeunes plantations ces dernières semaines. Surveillez leur présence ainsi que celles de prédateurs naturels (coccinelles et leurs larves, larves de syrphes, larves de cécidomyie, punaise de la molène).

➤ **Carpocapse de la pomme**

Nous sommes sur la fin de la première génération de ce ravageur avec 75-90% d'œufs éclos (larves) dans la région. Dans la majorité des vergers, les captures ont bien diminué dans la dernière semaine. Rappel d'alterner la matière active pour les interventions contre la G1 et la G2.

<i>Remarque pour le bio :</i> Nous recommandons les produits à base de granulovirus uniquement contre la G1 du carpocapse. Contre la G2, privilégier le spinosad (max 3 traitements par saison).
--

➤ **Mouche de la pomme**

Quelques parcelles ont fait l'objet d'une première intervention jusqu'à présent. Pour les entreprises utilisant le GF-120, certaines sont rendues à leur 3^e application. Selon le modèle CIPRA, nous approchons du 50% des adultes émergés dans la région (début semaine prochaine pour les sites chauds). Surveillez la présence de dommages, particulièrement dans les variétés

sensibles (Sunrise, Gingergold, Honeycrisp, Primgold, Spartan).

Rappels des seuils d'intervention : 1er Tt = 2 mouches cumul. / sphère. 2ème Tt = 4 mouches cumul. / sphère. Le décompte pour le 2e traitement est à repartir après 10 jours $\pm$ OU 25mm de pluie (sauf pour l'insecticide GF-120). Passé ce délai, il faut repartir le décompte. Pour le GF-120, celui-ci doit être renouvelé aux 7 jours ou aux 10 mm de pluie. Attention aux délais avant récolte et de réentrée dans le verger !

➤ **Acariens (mite rouge, mite à deux points, mite McDaniel, ériophyide)**

Quelques parcelles en dépistage ont fait l'objet d'une première intervention dans le dernier mois (certaines parcelles rares sont rendues à leur 2^e traitement), principalement pour la mite rouge et l'ériophyide. Globalement, la situation régionale semble être plus tranquille que ce que nous avons connu dans les dernières années, probablement en raison d'un hiver plus rigoureux et d'un printemps frais.

Les conditions d'applications des acaricides sont déterminantes sur la réussite de votre Tt :

- ✚ Minimum 24 heures sans pluie après le Tt
- ✚ T° minimale de 18°C, T° optimale > 20°C afin que les acariens soient actifs.
Privilégier tôt le matin ou en fin de journée lorsque les T° sont trop élevées dans le jour (T>25°C)
- ✚ Qté de bouillie : 1000L d'eau / ha
- ✚ ***Appliquer SEUL***
- ✚ Vents faibles (< 10 km/h) afin de bien couvrir la cible

➤ **Scarabée japonais**

Ce ravageur semble être assez tranquille cette année. Bien que sa présence ait été remarquée ici et là, rares ont été les dommages justifiant une intervention. À noter que son parasitoïde semble être plus présent cette année (point blanc oval derrière la tête).

Complexe moucheture et tache de suie

Une infection est prévue avec la pluie de mardi-mercredi. Pour les entreprises avec historique, si votre dernier traitement a été lessivé, assurez-vous de renouveler votre protection avec un fongicide efficace contre la maladie (captane/folpet/B2K+soufre).

Engrais foliaire

Rappel de renouveler vos apports de calcium dans les variétés sensibles à la tache amère (Cortland, Honeycrisp, Passionata) aux 7-10 jours. Rappel également que la 3^e et dernière application de magnésium est à réaliser au courant du mois de juillet si ce n'est pas déjà fait. Une carence en magnésium peut accélérer la maturité des fruits à la récolte.

Surgreffage et pépinières

Surgreffage : Il est temps de penser à retirer le ruban adhésif noir sur les troncs de surgreffage réalisés ce printemps. N'oubliez pas d'installer vos poteaux pour attacher le surgreffage (peut être fait jusqu'à après la récolte). Ces tuteurs devront rester en place pour au moins 5 ans !

Pépinières : Dès que les greffes de ce printemps auront atteint 30-40 cm, pensez à installer des tuteurs et aussi à attacher vos pommiers. Voir aussi aux traitements phyto et au désherbage...