



## Gerçures de l'épiderme des fruits



Rare  
Risques de dommages modérés

### Fiche technique synthèse



B

#### Ne pas confondre avec...

- une [carence en bore](#),
- le [chance gommeux sur tige](#),
- des dégâts d'alimentation de [thrips](#).

#### Pour en savoir plus

IRIIS – [Symptôme causé par écart de température](#)

### Symptômes

**Fruits :** Fines gerçures subérisées beiges à grisâtres qui forment des cicatrices liégeuses et superficielles sur l'épiderme dans le dernier tiers du fruit surtout. Épiderme vert pâle autour des dommages. Pas de symptôme sur la chair. Les fruits affectés sont généralement amers et non commercialisables.

### Conditions favorables

- Stress d'origine climatique lié aux grands écarts de température.
- Présence d'eau froide persistante sur les fruits et courants d'air froid.
- Stratification de l'air (air froid au bas des plants et air chaud à l'apex).

### Bonnes pratiques

- Éviter les écarts importants de température entre le jour et la nuit. Augmenter graduellement la température dans la serre avant le lever du soleil.
- Éviter la formation de condensation sur les plants.

### Auteur(s)

Compilation de l'information et révision: Liette Lambert, agronome, MAPAQ Sainte-Martine

Montage : Francisca Müller, agronome, MAPAQ Sainte-Martine

Crédits photos : Samuel Bourdeau, La Coop (A); Alain Cécyre, Plant Prod (B).