


Ferme Longprés (2009) Ltée

Grandes cultures biologiques

Les Cèdres



- **Superficie** : 602 ha
- **Travail du sol** : Chisel (2/3), billons, disques, labour
- **Cultures**



- Maïs (RG)
- Soya
- Blé (Tr/luz)
- Avoine (Tr/luz)
- Tournesol (RG)
- Pois
- Jachère

- **Espèce de CC** : Raygrass intercalaire (maïs, tournesol)
Trèfles, luzerne intercalaires (céréales)
Pois fourrager en dérobée
- Gestion de CC depuis **18 ans**.

Engrais vert de ray-grass dans le maïs et le tournesol

- 8 kg /ha au billonnage
- Détruit l'année suivante avec un sarcler lourd dans le soya.
- Problème de montée en graines certaines années





automne

printemps



Trèfle/luzerne dans les céréales

- 8 kg/ha de trèfle ou luzerne en prélevée
- Semis avec le peigne
- Fournit l'azote du maïs subséquent.
- Détruit au scalpeur ou à la charrue en novembre.



Peigne et semoir combiné



Pois après la récolte de céréales

- Rattrapage d'un trèfle raté
- Déchaumage avec des disques
- Semis 200 kg/ha de pois (40-10)
- 100 kg d'azote/ha si semé assez tôt

Pois après une jachère d'été

- Peut suivre un nivellement, drainage
- Semis début août, meilleures performances
- 200 kg/ha de pois 40-10
- 135 kg N/ha en 2015
- Très bon précédent pour le maïs



Semoir à deux compartiments

Semis sous les pattes d'oies





09/10/2014