

TAVELURE

Risques météorologique d'infection

La pluie a débutée peu après 6hrs ce matin pour les 5 stations de la région. Ce qui ns donne aujourd'hui à 15hrs, presque 9h00 de mouillure à une T de l'ordre de 9°C... et il ne semble pas avoir séchage malgré la pluie qui a arrêté pour l'instant (HR>85%). Les accumulations de pluie varient légèrement, en moyenne ... 3mm pour St-Joseph 640 ...4mm pour Oka Ste-Sophie, Oka, et St-Benoit ... 5mm pour St-Joseph. Sachez qu'à cette température, ça prend 12h de mouillure pour avoir 1 R mini.

Développement foliaire

A la parcelle de référence de la région de McIntosh/cepiland (1720 principal STJ), ns avons mesuré ce matin le développement foliaire et ns sommes rendus au stade débourrement (80% des bourgeons observés sont débourrés).

Encore une fois, ns vs incitions à marcher votre verger afin de vérifier l'état d'avancement du débourrement de vos parcelles et de vos variétés. Notez que le stade de débourrement est atteint lorsque 50 % des bg sont débourrés... qu'on entrevoit du vert.

Maturité des ascospores

Elles sont matures et prêtes à éjecter... Les données du labo de l'IRDA ns l'a confirmé !

ANALYSE

Nous retenons 2 cas de figure...

- + 1^{er} cas de figure ... vs n'êtes pas encore intervenus ET vs êtes débourrés :** Intervenir en stop avec un fongicide de contact sur minimalement les variétés sensibles avant l'atteinte du Risque Léger (si les prévisions se confirment, le RL sera atteint à 20hrs).

- + 2^{ème} cas de figure ... vs êtes intervenu hier, jeudi le 20 avril avec un cuivre puisque vs étiez débourrés :** Vs êtes couvert sur cette infection. Pensez à vs protégez avant la prochaine pluie.

Quel produit utiliser ?

Choix de contact en conventionnel :

- captan → ATTENTION, ceux qui prévoient appliquer de l'huile pour la cochenille et/ou les œufs de mites rouges **pas de Captan/Maestro 8 à 10 jours AVANT et APRÈS une application d'huile**,
- manzate/dithane → fongicides durs sur la faune auxiliaire... à éviter si possible...
- polyram

Choix de contact en biologique :

- Kumulus → Pour éviter tout risque de rugosité sur vos fruits, après floraison vous devriez privilégier le Soufre Microfin au Kumulus. Même chose que pour le Captan/Maestro, éviter le soufre 8- 10 avant et après une application d'huile. Au risque de se répéter, notez qu'en ce qui concerne l'application de soufre à l'intérieur de ce délai, les traitements faits en 2014 par certaines entreprises n'ont montré aucune toxicité.

CUIVRE SUR CETTE INFECTION ? NON ! Ne pas utiliser le cuivre sur cette infection ! Le séchage risque d'être trop lent et donc risque de phyto... Nous avons jusqu'au stade « oreille de souris » pour placer ce traitement, affaire à suivre...