



Le RAP

RÉSEAU D'AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES

Leader en gestion intégrée
des ennemis des cultures

AVERTISSEMENT | CAROTTE ET CÉLERİ

N° 2, 25 mai 2017

- Résumé climatique et risques associés.
- Avancement des semis et plantations.
- Insectes : charançon de la carotte et punaises dans le céleri.

RÉSUMÉ CLIMATIQUE ET RISQUES ASSOCIÉS

Depuis la dernière semaine, les conditions climatiques ont été assurément plus favorables aux opérations culturales. Même si l'on retrouve encore des baissières humides par endroits, les sols se sont généralement asséchés. Les journées nuageuses demeurent fréquentes et les averses ont été dispersées. À part quelques jours à la fin de la semaine dernière, les températures sont demeurées plutôt fraîches pour la période de l'année. Certaines régions ont connu des journées de vents forts affectant parfois les semis.

AVANCEMENT DES SEMIS ET PLANTATIONS

Carottes

Dans toutes les régions, les semis se poursuivent, quitte à modifier la planification des champs prévus dans le Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) pour s'adapter à ceux dont les conditions de sols sont propices aux opérations culturales.

En Montérégie-Ouest, les semis sont terminés, du moins pour les primeurs. La levée est généralement bonne et uniforme. On note toutefois des problèmes dans quelques champs semés tôt ou dans les baissières; le sol croûté dans certains champs nuit également à la levée, parfois jusqu'à 50 %. Les premières nantaises atteignent le stade 2 feuilles.

Dans Lanaudière, la première feuille pointe parfois, mais la majorité des semis est généralement en émergence. La pression des mauvaises herbes est variable et les traitements herbicides débutent dans quelques champs. En Chaudière-Appalaches, certains semis sont au stade cotylédon alors que dans la région de la Capitale-Nationale, on ne note encore aucune levée dans les carottes de primeur.

Céleri

Les plantations se poursuivent en Montérégie-Ouest. La reprise est plutôt belle et la croissance excellente. Seulement quelques plants présentent de l'étranglement au collet, parfois suffisamment pour causer la mort du plant.

INSECTES

Charançon de la carotte

Les captures sont en augmentation dans les champs de carottes en Montérégie-Ouest. Quelques traitements ont été faits, parfois avant le stade recommandé de 2 feuilles, principalement dans les champs où les captures sont élevées et ayant un historique de dommages. Le piégeage permet d'évaluer la population présente et de cibler les champs où un traitement s'avère justifié. Dans les autres régions, le relevé des pièges installés dans quelques champs débute cette semaine.

Pour plus de détails sur le dépistage et la lutte contre cet insecte, consultez le [bulletin d'information permanent N° 1](#) du 4 mai 2007 intitulé « Le charançon de la carotte ».

Punaise terne et punaise brune

Les adultes de punaise terne et de punaise brune ont fait leur apparition dans les champs de céleri, mais aucune larve n'a encore été observée.

Cet avertissement a été rédigé par Céline Laroche, Carl Dion Laplante et Mario Leblanc. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les [avertisseurs du réseau Carotte et céleri ou le secrétariat du RAP](#). La reproduction de ce document ou de l'une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.