

Répondeur pomicole

Région de l'Estrie

Message #9 : mercredi 16 mai 2018

Tavelure

La pluie qui a débuté entre 9h et 10 h mardi matin aura causé un risque d'infection de niveau minimal dans les secteurs de Compton, Lennoxville, St-Georges-de-Windsor et Courcelles. Il y a eu de 6 à 9 h de mouillure à une température moyenne de 15°C. Pas d'infection dans le secteur de St-Germain-de-Grantham.

Dans le secteur de Stanstead :

La période de mouillure s'est prolongée au cours de la soirée et de la nuit. On compte **18 heures** de mouillures à une température moyenne de 9°C. Il y a une **infection de niveau moyen** en cours pour lequel il faut intervenir.

Vos pommiers sont protégés si...

- vous avez fait un traitement en protection lundi ou mardi matin, ou si vous avez fait un traitement « stop » mardi en après-midi ou en soirée.

Vos pommiers ne sont pas protégés si...

- Aucun traitement n'a été fait en protection ou en traitement « stop ». Il vous faudra intervenir en post-infection. Choisir un fongicide pénétrant pour lequel il n'y a pas de résistance connue dans votre verger (voir la [fiche 48](#) du Guide de PFI). Ces fongicides doivent être appliqués **sur un feuillage sec** pour une bonne absorption. Les conditions risquent d'être venteuses, assurez-vous que votre traitement atteigne la cible.

Fongicides pénétrants	Groupe chimique	Action en post-infection (en degrés heures)
Nova	3	1000 DH
Aprovia top	3 + 7	
Fontelis	7	480 DH
Aprovia	7	
Sercadis	7	

Fongicides pénétrants	Groupe chimique	Action en post-infection (en degrés heures)
Inspire super	3 + 9	750 DH
Luna	7 + 9	750 DH
Scala	9	750 DH
Sovran	11	480 DH
Flint	11	480 DH

[Tiré de la fiche 48 du Guide de PFI](#)

Par la suite, pensez à renouveler vos traitements en protection le plus près possible du prochain épisode de pluie.

Hoplocampe

Si ce n'est pas déjà fait, il est temps d'installer vos pièges pour le dépistage de l'hoplocampe. Les premiers adultes sont attendus le 19 mai dans les secteurs les plus chauds de la région, selon le modèle de prévisions sur CIPRA. Pour plus d'information, voir [ce vidéo](#).

Pollinisation

Pensez à prendre contact avec votre apiculteur pour la location de ruches. Si votre apiculteur habituel n'est pas disponible, consultez le site du CRAAQ pour une [liste d'apiculteurs](#) qui peuvent vous louer des ruches.

Engrais foliaire

En période pré-florale, pensez à faire vos applications foliaires d'azote (URÉE) et de bore (ex. :SOLUBOR). L'azote aide à la nouaison des fruits et le bore prévient la formation de tissus liégeux.

L'urée foliaire aurait aussi une efficacité partiellement contre la tavelure. Les apports d'urée peuvent se faire en mélange avec les fongicides entre le stade pré bouton rose et la fin mai. Lire aussi la fiche sur [la fertilisation sans nuire à la phytoprotection](#) pour plus de détails.

Données météorologiques et prévisions

- [Prévisions météo horaires \(Environnement Canada\)](#)
- [Environnement Canada](#) pour les diverses municipalités de l'Estrie
- Météomédia « [Zone verte](#) »
- Pour les secteurs bordant la frontière, [Eye on the sky](#) produit par l'observatoire du Musée Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.

Pour voir venir la pluie :

- [Radar météo de Montpellier, au Vermont](#)
- [Radar météo de Montréal](#)

Bonne journée !

Caroline Turcotte, agronome
819-820-3001 poste 4360
Cellulaire : 819-437-3600
caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca