

Le RAP

RÉSEAU D'AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES

Leader en gestion intégrée
des ennemis des cultures

AVERTISSEMENT | PÉPINIÈRES ORNEMENTALES

N° 3, 29 mai 2018

État de la situation des cultures ornementales en pépinière

- Insectes : Présence de punaise terne. Apparition de la lieuse de l'hydrangée.
- Maladies : Symptômes de rouge des aiguilles de l'épinette dépistés.

PROBLÉMATIQUES

Punaise terne
Lygus lineolaris



OBSERVATIONS

- Les premières punaises ternes de stades adulte (photo ci-contre) et larvaire (vert) ont été dépistées dans des productions de cèdre en Montérégie.
- Tous les stades larvaires de même que l'adulte causent des dégâts.
- Les dommages sur les pousses terminales (déformation, nanisme et perte de dominance apicale) peuvent affecter de nombreux feuillus et conifères.
- Dépister par battage ou à l'aide de plaquettes collantes blanches afin de déterminer si la population est assez élevée pour intervenir.

Fiche technique [Punaise terne](#)
[Insecticides homologués](#)

Lieuse de l'hydrangée
Exartema ferriferanum



- Des feuilles liées par des soies, abritant la larve de la lieuse de l'hydrangée, ont été vues dans différentes régions du Québec, dont la Capitale-Nationale, l'Estrie, les Laurentides et la Montérégie.
- Les dommages, d'ordre esthétique, peuvent empêcher la floraison des tiges d'*Hydrangea arborescens* affectées.
- Couper et détruire les extrémités de tiges affectées tôt dans la saison.
- Aucun insecticide n'est homologué spécifiquement contre ce ravageur.

Fiche technique [Lieuse de l'hydrangée](#)

PROBLÉMATIQUES

OBSERVATIONS

Rouge des aiguilles de l'épinette *Rhizosphaera kalkhoffii*



- Des symptômes ont été observés sur les aiguilles d'un an de jeunes épinettes en pépinière, notamment en Montérégie et en l'Estrie.
- De minuscules taches noires (fructifications) peuvent être visibles au printemps sur les aiguilles rouges.
- Espacer les plants en contenants, ou assurer un bon espacement lors de la plantation pour obtenir une bonne circulation d'air et contrôler l'humidité.
- Éviter d'irriguer par aspersion.
- Protéger les nouvelles pousses avec des fongicides préventifs, alors qu'elles mesurent de 1 à 2 cm de longueur.

Fiche technique [Rouge des aiguilles de l'épinette](#)
[Fongicides homologués](#)

Pour plus d'information

- Le site de [SAgE pesticides](#) donne de l'information sur les pesticides homologués ainsi que sur la gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci.
- Le site [IRIIS phytoprotection](#) est une banque de photos et d'informations sur les ennemis des cultures.
- Liste des [biopesticides homologués](#) dans les cultures de pépinières ornementales.

Source des photos : IQDHO (sauf lorsqu'une autre source est mentionnée)

Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agronome. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter [les avertisseurs du réseau Pépinières ornementales ou le secrétariat du RAP](#). La reproduction de ce document ou de l'une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.