AVERTISSEMENT | BLEUET EN CORYMBE

N° 7, 6 juin 2018

- Conditions climatiques.
- Stades de développement.
- Ravageur : Livrée des forêts.
- Maladie : Anthracnose.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas. Après les chaleurs quasi records de la semaine dernière, voici maintenant que des records de froid ont été battus dans certains secteurs du centre et de l'est du Québec. De nouveaux gels au sol ont été rapportés dans les régions de Chaudière-Appalaches et de l'Est-du-Québec. Le feuillage des plants rougit de nouveau. Pour en savoir plus, consultez le sommaire agrométéorologique de la dernière semaine.

STADES DE DÉVELOPPEMENT

Fruits verts du cultivar Berkeley
Photo : Violaine Joly-Séguin, agronome
Montérégie, 6 juin 2018

Régions	Bourgeons à feuilles	Bourgeons à fruits
Montérégie	Expansion des pousses	Fruit vert (grosseur petit pois) 'green fruit'
Laurentides et Lanaudière	Expansion des pousses	Nouaison 'early green fruit'
Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie	Expansion des pousses	Chute des corolles 'petal fall'
Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale	Expansion des pousses	Chute des corolles 'petal fall'
Bas-Saint-Laurent	Expansion des pousses	Boutons dégagés 'late pink bud'

Liste et photo des stades du bleuet en corymbe : Highbush blueberry growth stages table (en anglais)

Note : Le tableau ci-dessus indique les stades atteints dans certaines bleuetières pour le cultivar Patriot. Selon votre emplacement, les stades atteints par vos bleuetiers peuvent différer et être plus ou moins avancés.

LIVRÉE DES FORÊTS

Encore cette année, nos collaborateurs des Laurentides rapportent la présence de chenilles forestières dans quelques bleuetières. La livrée des forêts semble être l'espèce prédominante. Normalement, aucun traitement n'est recommandé contre cette chenille, mais dans certains cas, la défoliation peut être importante. Pour en savoir plus sur les chenilles forestières dans le bleuet en corymbe, consultez le bulletin d'information N° 17 du 1er juin 2017.

Nid de la livrée des forêts

Larve se nourrissant sur des feuilles de bleuetier

Photos : Larbi Zerouala, agronome
Laurentides, 6 juin 2018

ANTHRACNOSE

La période la plus à risque pour l'infection des fruits s'échelonne du début de la floraison jusqu'au fruit vert de la grosseur d'un petit pois. La pluie et l'humidité favorisent les infections. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'information N° 9 du 1er juin 2016. Voir la photo à la page suivante.

Symptômes d'anthracnose sur un fruit
Photo : Christian Lacroix, agr. (MAPAQ)

Cet avertissement a été rédigé par Christian Lacroix, agronome. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l'avertisseur du réseau Bleuet en corymbe ou le secrétariat du RAP. *La reproduction de ce document ou de l'une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.*

ENSEMBLE on fait avancer le Québec
Cultivons l'avenir 2
Une initiative fédérale-provinciale-territoriale
Canada
Québec