

# Yukon Gold

Comité  
pomme de terre  
du CPVQ

Profil techniques et agronomiques de cultivars de POMMES DE TERRE - 2<sup>e</sup> série

## Période de commercialisation

Septembre à mai

## Caractères descriptifs

Forme des tubercules	Ovale, légèrement aplatie
Yeux	Superficiels, de couleur rose
Talon	Superficiel
Peau ( <i>couleur, texture</i> )	Chamois, jaunâtre, légèrement floconneuse
Chair	Jaune pâle
Densité relative	Moyenne à élevée

## Comportement

Potentiel de rendement	Moyen
Repos végétatif	Long
Calibre	Moyen
Conservation	Excellente
Aptitude au lavage	Moyenne

## Sensibilités et résistances

Maladies : sensibilités	Gale commune, mosaïque rugueuse, virus Y
Maladies : résistances	Enroulement, mosaïque légère, virus A
Défauts ( <i>internes, externes</i> ) : sensibilités	Cœur creux sur les gros tubercules
Environnement ( <i>air, eau, sol</i> )	Aucune particularité de région
Pesticides	Aucune sensibilité connue
Produits chimiques	Sensible aux polluants atmosphériques qui provoquent la mort prématurée des plants

## Régie de production

Plantation	Distance : 25 cm, sol bien réchauffé à plus de 7,2°C
Fertilisation	135 à 145 kg / ha d'azote
Type de sol	Varié
Régie de l'eau	Approvisionnement régulier
Défanage	Facile
Façons culturales	Nécessite un buttage important
Entreposage - Conservation	Conservation excellente
Récolte	Mi-saison à tardive, attention aux gros tubercules ( <i>cœur creux</i> )
Rotation	2 années ( <i>pomme de terre / autre culture</i> )

## Marché principal



Bouillie



Four




Frite



Purée

## Précocité comparative



# Yukon Gold

## REMARQUES

### Description générale

Yukon Gold est un des rares cultivars au Canada qui présente la particularité d'avoir une chair jaune. Il est d'excellente qualité pour la cuisson à l'eau et au four. Il est apprécié pour la préparation de frites au foyer. Comme il a tendance à produire de gros tubercules au cœur creux, il perd de sa popularité auprès des emballeurs.

### Préparation de la semence

La semence a besoin d'être réchauffée avant la plantation, car les germes se développent très lentement. La plantation, immédiatement après le tranchage, n'est pas recommandée. Il faut planter des tubercules entiers ou réaliser le tranchage à l'avance. Il importe d'assurer aux tubercules tranchés des conditions de cicatrisation :

- traiter la semence tranchée avec un fongicide ;
- entreposer la semence tranchée sur une hauteur inférieure à 1 m ;
- bien ventiler et maintenir l'humidité relative à 90 % ;
- conserver, pendant au moins 3 jours, à une température de 12 à 15°C ;
- la plantation peut être réalisée dès que la semence est bien cicatrisée ;
- si la plantation est retardée, il faut abaisser la température à 5°C afin d'éviter la formation de longs germes fragiles.

### Régie

Yukon Gold nécessite un buttage important après le début de la tubérisation pour réduire le verdissement et protéger les tubercules du mildiou.

Il importe de bien surveiller le développement des tubercules et de pratiquer le défanage pour contrôler leur grosseur et prévenir les cœurs creux.

### Marché

Ce cultivar, créé au Canada, a été très médiatisé. Il est populaire dans des secteurs spécifiques et il ouvre la voie à la commercialisation avec identification du nom du cultivar.

**CPVQ**

CONSEIL  
DES PRODUCTIONS  
VÉGÉTALES  
DU QUÉBEC inc.