



La framboise noire :
le secret est dans la taille !
 Josée Bonneville, agr.

Framboisiers Pourpres

Royalty :

Variété tardive, de bonne productivité. Les fruits pourpres sont très fermes, de bonne saveur mais légèrement acides. Idéal pour la transformation.

Framboisiers Noirs

Jewel :

Variété de framboisiers noirs, mi-saison. Plant très vigoureux et rustique. Fruit très attrayant et savoureux. Résistant à l'antracnose

Développement des framboisiers


Framboisier noir	Framboisier rouge
<ul style="list-style-type: none"> ■ Les nouvelles pousses se développent à partir de la base des cannes ■ Les nouvelles pousses se développent en longueur 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les racines émettent de nouvelles pousses chaque année

Plantation

- Choix du terrain – Préparation du sol – Entretien des plantations établies
- Espacement entre les rangs 1,80 à 3 m
- Espacement entre les rangs 0,75 à 0,90 m sur le rang
- Les framboisiers noirs ne produisent pas de drageons

Écimage des pousses en été

- Au début de l'été, lorsque les plants ont atteint 28''-30'', couper l'extrémité des jeunes tiges d'une hauteur de 2'' à 3''
- Cette taille stimule les bourgeons et la formation des rameaux latéraux
- Les plants sont robustes et ont une grande quantité de bois à fruit
- Le palissage peut demeurer toujours important



Les retardataires

- Si les pousses n'atteignent pas la bonne hauteur avant la récolte ; elles sont laissées telles quelles
- Les pousses écimées trop tard produiront des latéraux moins vigoureux et plus sensibles au gel hivernal

Le défi !

- Avoir le temps de passer plusieurs fois pour écimé toutes les pousses à la bonne hauteur !

Rabattage des rameaux latéraux

- Ne pas raccourcir les latéraux avant le printemps ; mais au printemps ...
- Les rameaux latéraux peuvent atteindre plus d'un mètre de longueur




Rabattage des rameaux latéraux

- Pour diminuer la compétition entre les bourgeons à fruits : on retaille
- Laisser de 8 à 10 bourgeons à fruits sur chaque rameau
- Supprimer tous les bois morts



Avant & Après la taille des rameaux



Éclaircissage des cannes- Après la récolte

- Les nouvelles pousses se développent à partir de bourgeons situés à la base des cannes
- Couper les cannes qui ont moins de 12 mm de diamètre
- Laisser 5 à 8 cannes robustes par touffe

Pour le taille : la suite

- Conserver les cannes robustes espacées entre 15 et 20 cm
- Idéalement la base des rangs ne doit pas dépasser 30 cm pour faciliter la cueillette

Qualités et Défauts de la framboise noire

- | | |
|---|--|
| ■ Sensible au gel | ■ Excellent goût |
| ■ Sensible à la flétrissure verticillienne | ■ Très ferme |
| | ■ Belle apparence |
| ■ Renferme parfois de petites graines dures | ■ Bonne productivité (rendement visé de 5 T\ha à 6 T\ha) |

Références

La culture des mûres, des framboises noires, et des framboises pourpres

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario

F.J. Louws- Direction des productions végétales / MAAo Dale institut de recherche horticole de l'Ontario



Merci et bonne taille !