



# 3. À quoi s'attendre des changements climatiques?

## Côte-Nord



Présentation développée avec la collaboration d'Agriclimat

La reproduction d'extraits est autorisée à des fins non commerciales avec la mention de la source.

Toute reproduction partielle doit être fidèle au texte utilisé.  
©Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, 2023

# Portrait global

## Variations saisonnières : Côte-Nord




# Saison froide




On calcule la période d'enneigement dès qu'il y a plus de 3 cm (1 po) de neige au sol.

Durée de la période d'enneigement : Côte-Nord

Historique 1999-2010



Futur 2041-2070



1999-2010 : 174 jours  
2041-2070 : 138 jours

$\Delta$  : - 36 jours (- 20 à - 71 jours)

**Épaisseur max neige**  
1971-2000 : 233 mm  
2041-2070 : 164 mm

$\Delta$  : - 64 mm (- 120 à - 19 mm)

# Saison froide

Évolution du nombre de cycles gel/dégel : **Côte-Nord**




Un cycle gel/dégel correspond à une journée où la Tmax > 0 °C et Tmin < 0 °C.

	Annuel	Hiver : décembre-janvier-février
1991-2020	78 jours	12 jours
2041-2070	67 jours	20 jours
Δ	- 11 jours (- 17 à - 3 jours)	+ 8 jours (+ 2 à +11 jours)

# Impacts liés à la saison froide

- Augmentation des risques pour les plantes de manquer de préparation à l'hiver (**endurcissement au froid**) et de s'éveiller en cours d'hiver (**perte d'endurcissement**)
- Amplification du risque de **dommages hivernaux causés par le gel.**
- Augmentation des risques **d'asphyxie de la plante**
- Augmentation des risques de **dommages physiques au système racinaire.**



## Impact :

On s'attend à ce que l'effet combiné de ces différents éléments cause plus de dommages aux plantes fourragères.

# Synchronisme gel/saison de croissance



## Côte-Nord



On considère que la saison de croissance débute lorsque la température moyenne quotidienne est supérieure à 5,5 °C durant 5 jours consécutifs

	1991-2020	2041-2070	Variation
Date début de la saison de croissance	04 mai	23 avril	<b>11 jours</b> plus tôt (entre 3 et 19 jours)
Date de fin de la saison de croissance	27 octobre	08 novembre	<b>12 jours</b> plus tard (entre 4 et 18 jours)




Note : On prévoit un devancement du dernier gel au printemps de 12 jours (entre 6 et 17 jours) tandis que le premier gel à l'automne aura lieu 12 jours plus tard (entre 4 et 17 jours)

# Saison chaude :

Nombre de jours avec des températures > 30°C : Côte-Nord

Historique 1991-2020




 2023

1991-2020 : 1 jour  
2041-2070 : 4 jours

$\Delta$  : + 3 jours (+ 1 à + 8 jours)

Futur 2041-2070



**Épisode de canicule**  
1991-2020 : 0 période  
2041-2070 : 0 période  
 $\Delta$  : + 0 période (+ 0 à + 1 période)

# Saison chaude :

## Évolution du bilan hydrique cumulé




P-ETP

ETP = Évapotranspiration potentielle d'un couvert végétal (prairie rase)

Les réserves en eau du sol ne sont pas considérées



Déficit hydrique cumulé de mai à août (mm)



■ 1991-2020 ■ 2041-2070 ■ Région




2023

# Impacts liés à la saison chaude



- Allongement de la saison de croissance
- Augmentation des températures chaudes et des épisodes de canicules
- Hausse du **stress hydrique**



## Impact :

Certaines espèces pourraient profiter de l'allongement de la saison de croissance, mais l'augmentation des T° et du stress hydrique pourraient nuire au rendement potentiel.

# Pour en apprendre davantage

- Service de diagnostic et d'accompagnement offert par les conseillers accrédités Agriclimat
- Service de diagnostic offert par le CDAQ
- Chaîne [YouTube Agriclimat](#) :
  - plusieurs contenus sur la lutte contre les changements climatiques (incluant les évolutions du climat par région)
- Formations sur [CIBLE](#) :
  - Formation sur les plantes fourragères



Pour plus d'information, contactez Sarah Delisle, agr., coordonnatrice Agriclimat : [sarahdelisle@cdaq.qc.ca](mailto:sarahdelisle@cdaq.qc.ca)