



3. À quoi s'attendre des changements climatiques?

Lanaudière

Présentation développée avec la collaboration d'Agriclimat


La reproduction d'extraits est autorisée à des fins non commerciales avec la mention de la source.

Toute reproduction partielle doit être fidèle au texte utilisé.
©Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, 2023


Portrait global

Variations saisonnières : Lanaudière

Évolution des températures moyennes mensuelles



Évolution des précipitations totales mensuelles




Saison froide



On calcule la période d'enneigement dès qu'il y a plus de 3 cm (1 po) de neige au sol.

Durée de la période d'enneigement : **Lanaudière**

Historique 1999-2010




2017

1999-2010 : 139 jours

2041-2070 : 99 jours

Δ : - 41 jours (- 24 à - 73 jours)

Futur 2041-2070



Épaisseur max neige

1971-2000 : 171 mm

2041-2070 : 105 mm

Δ : - 66 mm (- 108 à - 30 mm)

Saison froide

Évolution du nombre de cycles gel/dégel : **Lanaudière**



Un cycle gel/dégel correspond à une journée où la Tmax > 0 °C et Tmin < 0 °C.

	Annuel	Hiver : décembre-janvier-février
1991-2020	90 jours	20 jours
2041-2070	80 jours	25 jours
Δ	- 11 jours (- 18 à - 7 jours)	+ 5 jours (- 2 à + 11 jours)

Impacts liés à la saison froide

- Augmentation des risques pour les plantes de manquer de préparation à l'hiver (**endurcissement au froid**) et de s'éveiller en cours d'hiver (**perte d'endurcissement**)
- Amplification du risque de **dommages hivernaux causés par le gel**.
- Augmentation des risques **d'asphyxie de la plante**
- Augmentation des risques de **dommages physiques au système racinaire**.



Impact :

On s'attend à ce que l'effet combiné de ces différents éléments cause plus de dommages aux plantes fourragères.

Synchronisme gel/saison de croissance

Lanaudière



On considère que la saison de croissance débute lorsque la température moyenne quotidienne est supérieure à 5,5 °C durant 5 jours consécutifs

	1991-2020	2041-2070	Variation
Date début de la saison de croissance	21 avril	13 avril	8 jours plus tôt (entre 3 et 17 jours)
Date de fin de la saison de croissance	05 novembre	14 novembre	9 jours plus tard (entre 5 et 16 jours)




Note : On prévoit un devancement du dernier gel au printemps de 10 jours (entre 6 et 14 jours) tandis que le premier gel à l'automne aura lieu 12 jours plus tard (entre 5 et 19 jours)

Saison chaude :

Nombre de jours avec des températures $> 30^{\circ}\text{C}$: Lanaudière

Historique 1991-2020




 OURANOS 2023

1991-2020 : 7 jours
2041-2070 : 22 jours

Δ : + 15 jours (+ 8 à + 25 jours)

Futur 2041-2070



Épisode de canicule
1991-2020 : 1 période
2041-2070 : 3 périodes
 Δ : + 2 périodes (+ 1 à + 4 périodes)

Saison chaude :


Évolution du bilan hydrique cumulé



P-ETP
ETP = Évapotranspiration potentielle d'un couvert végétal (prairie rase)
Les réserves en eau du sol ne sont pas considérées



Déficit hydrique cumulé de mai à août (mm)



1991-2020

2041-2070

Région



2023

Impacts liés à la saison chaude



- Allongement de la saison de croissance
- Augmentation des températures chaudes et des épisodes de canicules
- Hausse du **stress hydrique**



Impact :

Certaines espèces pourraient profiter de l'allongement de la saison de croissance, mais l'augmentation des T° et du stress hydrique pourraient nuire au rendement potentiel.

Pour en apprendre davantage

- Service de diagnostic et d'accompagnement offert par les conseillers accrédités Agriclimat
- Service de diagnostic offert par le CDAQ
- Chaîne [YouTube Agriclimat](#) :
 - plusieurs contenus sur la lutte contre les changements climatiques (incluant les évolutions du climat par région)
- Formations sur [CIBLE](#) :
 - Formation sur les plantes fourragères



Pour plus d'information, contactez Sarah Delisle, agr., coordonnatrice Agriclimat : sarahdelisle@cdaq.qc.ca