



3. À quoi s'attendre des changements climatiques?

Outaouais


Présentation développée avec la collaboration d'Agriclimat

La reproduction d'extraits est autorisée à des fins non commerciales avec la mention de la source.


Toute reproduction partielle doit être fidèle au texte utilisé.
©Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, 2023

Portrait global

Variations saisonnières : Outaouais



OURANOS 2023



OURANOS 2023


Saison froide




On calcule la période d'enneigement dès qu'il y a plus de 3 cm (1 po) de neige au sol.

Durée de la période d'enneigement : **Outaouais**

Historique 1999-2010



Futur 2041-2070



Épaisseur max neige

1971-2000 : 143 mm

2041-2070 : 89 mm

Δ : - 55 mm (- 87 à - 20 mm)

1999-2010 : 133 jours
2041-2070 : 93 jours

Δ : - 40 jours (- 20 à - 66 jours)

Saison froide

Évolution du nombre de cycles gel/dégel : Outaouais



Un cycle gel/dégel correspond à une journée où la Tmax > 0 °C et Tmin < 0 °C.

	Annuel	Hiver : décembre-janvier-février
1991-2020	89 jours	23 jours
2041-2070	79 jours	27 jours
Δ	- 10 jours (- 21 à - 6 jours)	+ 3 jours (- 5 à + 9 jours)

Impacts liés à la saison froide

- Augmentation des risques pour les plantes de manquer de préparation à l'hiver (**endurcissement au froid**) et de s'éveiller en cours d'hiver (**perte d'endurcissement**)
- Amplification du risque de **dommages hivernaux causés par le gel**.
- Augmentation des risques **d'asphyxie de la plante**
- Augmentation des risques de **dommages physiques au système racinaire**.



Impact :

On s'attend à ce que l'effet combiné de ces différents éléments cause plus de dommages aux plantes fourragères.

Synchronisme gel/saison de croissance



Outaouais



On considère que la saison de croissance débute lorsque la température moyenne quotidienne est supérieure à 5,5 °C durant 5 jours consécutifs

	1991-2020	2041-2070	Variation
Date début de la saison de croissance	16 avril	09 avril	7 jours plus tôt (entre 4 et 14 jours)
Date de fin de la saison de croissance	09 novembre	18 novembre	8 jours plus tard (entre 5 et 16 jours)




2023

Note : On prévoit un devancement du dernier gel au printemps de 10 jours (entre 6 et 14 jours) tandis que le premier gel à l'automne aura lieu 12 jours plus tard (entre 5 et 19 jours)

Saison chaude :

Nombre de jours avec des températures > 30°C : **Outaouais**

Historique 1991-2020




2023

1991-2020 : 10 jours
2041-2070 : 28 jours

Δ : + 18 jours (+ 10 à + 30 jours)

Futur 2041-2070



Épisode de canicule
1991-2020 : 1 période
2041-2070 : 4 périodes
Δ : + 3 périodes (+ 2 à + 4 périodes)

Saison chaude :

Évolution du bilan hydrique cumulé




P-ETP

ETP = Évapotranspiration potentielle d'un couvert végétal (prairie rase)

Les réserves en eau du sol ne sont pas considérées



Déficit hydrique cumulé de mai à août (mm)



2023

Impacts liés à la saison chaude



- Allongement de la saison de croissance
- Augmentation des températures chaudes et des épisodes de canicules
- Hausse du **stress hydrique**



Impact :

Certaines espèces pourraient profiter de l'allongement de la saison de croissance, mais l'augmentation des T° et du stress hydrique pourraient nuire au rendement potentiel.

Pour en apprendre davantage

- Service de diagnostic et d'accompagnement offert par les conseillers accrédités Agriclimat
- Service de diagnostic offert par le CDAQ
- Chaîne [YouTube Agriclimat](#) :
 - plusieurs contenus sur la lutte contre les changements climatiques (incluant les évolutions du climat par région)
- Formations sur [CIBLE](#) :
 - Formation sur les plantes fourragères



Pour plus d'information, contactez Sarah Delisle, agr., coordonnatrice Agriclimat : sarahdelisle@cdaq.qc.ca