



3. À quoi s'attendre des changements climatiques? Mauricie

Présentation développée avec la collaboration d'Agriclimat

La reproduction d'extraits est autorisée à des fins non commerciales avec la mention de la source.

Toute reproduction partielle doit être fidèle au texte utilisé.


©Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, 2023

Portrait global

Variations saisonnières : Mauricie




Évolution des températures moyennes mensuelles



3,9 °C
+ 2,3 °C
= 6,2 °C

Évolution des précipitations totales mensuelles



1 043 mm
+ 67 mm
= 1 110 mm

Saison froide




On calcule la période d'enneigement dès qu'il y a plus de 3 cm (1 po) de neige au sol.




Durée de la période d'enneigement : **Mauricie**

Historique 1999-2010



2017




1999-2010 : 148 jours

2041-2070 : 109 jours

Δ : - 39 jours (- 23 à - 73 jours)

Futur 2041-2070



Épaisseur max neige

1971-2000 : 199 mm

2041-2070 : 127 mm

Δ : - 72 mm (- 120 à - 32 mm)

Saison froide

Évolution du nombre de cycles gel/dégel : **Mauricie**



 Un cycle gel/dégel correspond à une journée où la Tmax > 0 °C et Tmin < 0 °C.

	Annuel	Hiver : décembre-janvier-février
1991-2020	90 jours	18 jours
2041-2070	79 jours	22 jours
Δ	- 11 jours (- 20 à - 7 jours)	+ 5 jours (- 2 à + 9 jours)

Impacts liés à la saison froide

- Augmentation des risques pour les plantes de manquer de préparation à l'hiver (**endurcissement au froid**) et de s'éveiller en cours d'hiver (**perte d'endurcissement**)
- Amplification du risque de **dommages hivernaux causés par le gel**.
- Augmentation des risques **d'asphyxie de la plante**
- Augmentation des risques de **dommages physiques au système racinaire**.

Impact :

On s'attend à ce que l'effet combiné de ces différents éléments cause plus de dommages aux plantes fourragères.

Synchronisme gel/saison de croissance

Mauricie



On considère que la saison de croissance débute lorsque la température moyenne quotidienne est supérieure à 5,5 °C durant 5 jours consécutifs


	1991-2020	2041-2070	Variation
Date début de la saison de croissance	23 avril	14 avril	8 jours plus tôt (entre 4 et 17 jours)
Date de fin de la saison de croissance	02 novembre	11 novembre	9 jours plus tard (entre 4 et 16 jours)

Note : On prévoit un devancement du dernier gel au printemps de 10 jours (entre 6 et 14 jours)
tandis que le premier gel à l'automne aura lieu 12 jours plus tard (entre 4 et 18 jours)


Saison chaude :

Nombre de jours avec des températures $> 30^{\circ}\text{C}$: **Mauricie**

Historique 1991-2020



 2023




1991-2020 : 6 jours

2041-2070 : 20 jours

Δ : + 13 jours (+ 7 à + 24 jours)

Futur 2041-2070



Épisode de canicule

1991-2020 : 1 période

2041-2070 : 3 périodes

Δ : + 2 périodes (+ 1 à + 4 périodes)

Saison chaude :


Évolution du bilan hydrique cumulé



P-ETP
ETP = Évapotranspiration potentielle d'un couvert végétal (prairie rase)
Les réserves en eau du sol ne sont pas considérées



Déficit hydrique cumulé de mai à août (mm)



Impacts liés à la saison chaude

- Allongement de la saison de croissance
- Augmentation des températures chaudes et des épisodes de canicules
- Hausse du **stress hydrique**

Impact :

Certaines espèces pourraient profiter de l'allongement de la saison de croissance, mais l'augmentation des T° et du stress hydrique pourraient nuire au rendement potentiel.

Pour en apprendre davantage

- Service de diagnostic et d'accompagnement offert par les conseillers accrédités Agriclimat
- Service de diagnostic offert par le CDAQ
- Chaîne [YouTube Agriclimat](#) :
 - plusieurs contenus sur la lutte contre les changements climatiques (incluant les évolutions du climat par région)
- Formations sur [CIBLE](#) :
 - Formation sur les plantes fourragères



Pour plus d'information, contactez Sarah Delisle, agr.,
coordonnatrice Agriclimat : sarahdelisle@cdaq.qc.ca