

Tableau des observations régionales

Chaque producteur-collaborateur du Réseau d'avertissements phytosanitaires a une station météorologique installée sur son site d'observation. La station est située dans une plantation, à la mi-hauteur d'un arbre de 6 à 7 pieds (environ 2 mètres). Les degrés-jours, inscrits dans le tableau, proviennent de ces stations, à moins d'avis contraire*.

Sites d'observation	Stades des bourgeons			Degrés-jours (base 2)		
	2017 (15 mai)	2018 (14 mai)	2019 (13 mai)	2017 ¹ (15 mai)	2018 ² (14 mai)	2019 (13 mai)
Rivière-du-Loup (altitude 110 mètres)	ND	ND	ND	111*	115*	92*
Saint-Méthode	Stade I : 60 % Stade I+ : 40 %	Stade I : 70 % Stade I+ : 30 %	Stade I : 100%	178	162	95*
Inverness (altitude 238 mètres)	Stade I : 55 % Stade I+ : 40 % Stade II : 5 %	Stade I : 70 % Stade I+ : 30 %	Stade I : 100%	160	190	126
East-Hereford (altitude 343 mètres)	Stade I : 10 % Stade I+ : 40 % Stade II : 50 %	Stade I : 50 % Stade I+ : 50 %	Stade I : 75 % Stade I+ : 25 %	198	181	137
Bury	Stade I : 20 % Stade I+ : 50 % Stade II : 30 %	Stade I : 30 % Stade I+ : 60 % Stade II : 10 %	Stade I : 100%	230	190	140*
Ham-Nord (altitude 276 mètres)	Stade I : 40 % Stade I+ : 50 % Stade II : 10 %	Stade I : 80 % Stade I+ : 20 %	Stade I : 75 % Stade I+ : 25 %	207	186	138
Ayer's Cliff (altitude 297 mètres)	Stade I+ : 50 % Stade II : 45 % Stade III : 5 %	Stade I+ : 20 % Stade II : 75 % Stade III : 5 %	Stade I : 50 % Stade I+ : 50 %	264	226	183
Trois-Rivières	Stade I : 100 %	Stade I : 100 %	Stade I : 100 %	102*	104*	140
Saint-Armand-de-Missisquoi (altitude 122 mètres)	Stade I : 20 % Stade II : 80 %	Stade I+ : 30 % Stade II : 40 % Stade III : 30 %	Stade I+ : 50 % Stade II : 40 % Stade III : 10 %	284	240	218

ND : données non disponibles

1. Le cumul des degrés a débuté le 23 mars 2017. La maturité des œufs avait été précisée par l'équipe de l'Université Laval.

2. Le cumul des degrés-jours a débuté le 1^{er} avril en 2018 et en 2019.

* Les données de degrés-jours suivies d'un astérisque indiquent qu'il s'agit d'une évaluation à partir d'une autre station météorologique située dans la région où se trouve le site d'observation. Ces données ont été compilées à partir du site d'[Agrométéo Québec](#).