

Tableau des observations régionales

Sites d'observation	Stades des bourgeons	Degrés-jours (base 5,4 °C)
	2021 (19 avril)	2021 ¹ (19 avril)
Rivière-du-Loup Bas-Saint-Laurent	Stade I : 100 %	61*
Sainte-Marguerite-de-Lingwick Estrie	Stade I : 100 %	128*
Saint-Honoré Chaudière-Appalaches	Stade I : 100 %	113*
Inverness Centre-du-Québec	Stade I : 100 %	123*
East-Hereford Estrie	Stade I : 100 %	116*
Sand Hill Estrie	Stade I : 100 %	133*
Ham-Nord Centre-du-Québec	Stade I : 100 %	116*
Ayer's Cliff Estrie	Stade I : 95 % Stade I+ : 5 %	128*
Trois-Rivières Mauricie	Stade I : 100 %	89*
Saint-Armand-de-Missisquoi Montréal-Est	Stade I : 80 % Stade I+ : 20 %	143*

1. Le cumul des degrés-jours à partir du 1^{er} mars, selon le chiffrier du [modèle prévisionnel de l'éclosion printanière du puceron](#). Cent six (106) degrés-jours sont nécessaires pour que débute l'éclosion des œufs de pucerons.

* Les données de degrés-jours suivies d'un astérisque indiquent qu'il s'agit d'une évaluation à partir d'une autre station météorologique située dans la région où se trouve le site d'observation. Ces données ont été compilées à partir du site d'[Agrométéo](#).