

Tableau des observations régionales

Sites d'observation	Stades des bourgeons	Degrés-jours (base 5,4 °C)
	2021 (26 avril)	2021 ¹ (26 avril)
Rivière-du-Loup Bas-Saint-Laurent	Stade I : 100 %	77*
Sainte-Marguerite-de-Lingwick Estrie	Stade I : 100 %	149*
Saint-Honoré Chaudière-Appalaches	Stade I : 70 % Stade I+ : 30 %	134*
Inverness Centre-du-Québec	Stade I : 100 %	147*
East-Herford Estrie	Stade I : 100 %	135*
Sand Hill Estrie	Stade I : 70 % Stade I+ : 30 %	155*
Ham-Nord Centre-du-Québec	Stade I : 75 % Stade I+ : 25 %	135*
Ayer's Cliff Estrie	Stade I : 95 % Stade I+ : 5 %	150*
Trois-Rivières Mauricie	Stade I : 100 %	114*
Saint-Armand-de-Missisquoi Montérégie-Est	Stade I : 50 % Stade I+ : 50 %	166*

- 1) Le cumul des degrés-jours à partir du 1^{er} mars, selon le chiffrier du [modèle prévisionnel de l'éclosion printanière du puceron](#). 106 degrés-jours sont nécessaires pour débuter l'éclosion des œufs de pucerons.
- * Les données de degrés-jours suivies d'un astérisque indiquent qu'il s'agit d'une évaluation à partir d'une autre station météorologique située dans la région où se trouve le site d'observation. Ces données ont été compilées à partir du site [d'Agrométéo](#).