

Tableau 1

Moyenne des captures par piège des adultes de la cicadelle de la pomme de terre (CPT) et de la cicadelle de l'aster (CA), en date du 2 juillet 2020.

Date de prélèvement

Région	2020-05-24 - 2020-05-30		2020-05-31 - 2020-06-06		2020-06-07 - 2020-06-13		2020-06-14 - 2020-06-20		2020-06-20 - 2020-06-27		2020-06-28 - 2020-07-04*	
	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA
Bas-Saint-Laurent							ND	ND	ND	ND	ND	ND
Capitale-Nationale	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	6,7	1,3	63,5	13,2	59,5	11,3
Chaudière-Appalaches					0,0	1,0	4,7	8,0	51,0	13,7	71,5	21,2
Lanaudière	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	14,5	0,5	3,5	78,0	15,5	67,6	5,0
Laurentides			0,5	0,0	0,5	1,0	13,5	6,5	139,5	3,0	156,5	6,0
Mauricie			0,0	0,0	1,0	0,0	22,0	12,0	28,0	19,6	20,0	18,0
Montérégie- Est			0,0	0,0	0,5	4,0	5,0	4,7	80,5	14,0	84,0	1,5
Saguenay-Lac-Saint-Jean							0,0	0,0	9,0	12,0	15,0	16,5
Total général	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	2,0	6,8	3,8	60,7	13,4	66,0	10,6

*Données partielles.

ND : données non disponibles.

Collaboration : Jean-Philippe Légaré, biologiste-entomologiste, MAPAQ.

Chaque champ est différent, et les données mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre indicatif seulement.

Elles ne sont pas une justification pour nécessairement intervenir contre les cicadelles dans votre région.