

Tableau 1 : Moyenne des captures par piège des adultes de la cicadelle de la pomme de terre (CPT) et de la cicadelle de l'aster (CA), en date du 23 juillet 2020

Région	Date de prélèvement															
	2020-05-31 2020-06-06		2020-06-07 2020-06-13		2020-06-14 2020-06-20		2020-06-21 2020-06-27		2020-06-28 2020-07-04		2020-07-05 2020-07-11		2020-07-12 2020-07-18		2020-07-19 2020-07-25*	
	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA
Bas-Saint-Laurent					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	63,0	1,0
Capitale-Nationale	0,1	0,0	0,0	0,2	6,7	1,3	63,5	13,2	59,5	11,3	45,7	1,1	71,2	0,8	37,5	3,8
Chaudière-Appalaches			0,0	1,0	4,7	8,0	51,0	13,7	71,5	21,2	10,0	1,5	26,8	2,7	11,2	5,7
Lanaudière	0,0	0,0	1,0	14,5	0,5	3,5	78,0	15,5	54,1	3,8	53,5	1,5	57,2	0,5	23,6	2,5
Laurentides	0,5	0,0	0,5	1,0	13,5	6,5	139,5	3,0	156,5	6,0	134,5	0,5	243,0	3,5	234,5	2,0
Mauricie	0,0	0,0	1,0	0,0	22,0	12,0	28,0	19,6	20,0	18,0	45,0	15,5	11,0	4,5	16,0	2,5
Montérégie-Est	0,0	0,0	0,5	4,0	5,0	4,7	65,5	9,3	76,8	1,6	14,8	0,8	45,3	1,1	101,7	32,0
Saguenay–Lac-Saint-Jean					0,0	0,0	9,0	12,0	14,5	9,7	23,0	4,2	1,0	0,0	1,7	0,2
Moyenne générale	0,1	0,0	0,2	2,0	6,8	3,8	59,4	12,7	60,6	9,3	39,8	2,2	59,4	1,2	44,7	5,5

*Données partielles.

ND : données non disponibles.

Collaboration : Jean-Philippe Légaré, biologiste-entomologiste, MAPAQ.

Chaque champ est différent, et les données mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre indicatif seulement; ces données ne sont pas une justification pour nécessairement intervenir contre les cicadelles dans votre région.