

Tableau 1 : Moyenne des captures par piège des adultes de la cicadelle de la pomme de terre (CPT) et de la cicadelle de l'aster (CA), en date du 30 juillet 2020

Région	Date de prélèvement															
	2020-06-07 2020-06-13		2020-06-14 2020-06-20		2020-06-21 2020-06-27		2020-06-28 2020-07-04		2020-07-05 2020-07-11		2020-07-12 2020-07-18		2020-07-19 2020-07-25		2020-07-26 2020-08-01*	
	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA	CPT	CA								
Bas-Saint-Laurent			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	63,0	1,0	43,0	11,5
Capitale-Nationale	0,0	0,2	6,7	1,3	63,5	13,2	59,5	11,3	45,7	1,1	71,2	0,8	37,5	3,8	43,7	5,1
Chaudière-Appalaches	0,0	1,0	4,7	8,0	51,0	13,7	71,5	21,2	10,0	1,5	26,8	2,7	11,2	5,7	41,2	15,2
Lanaudière	1,0	14,5	0,5	3,5	78,0	15,5	54,1	3,8	53,5	1,5	57,2	0,5	23,6	2,5	38,1	6,3
Laurentides	0,5	1,0	13,5	6,5	139,5	3,0	156,5	6,0	134,5	0,5	243,0	3,5	234,5	2,0	166,0	3,5
Mauricie	1,0	0,0	22,0	12,0	28,0	19,6	20,0	18,0	45,0	15,5	11,0	4,5	16,0	2,5	13,5	2,5
Montérégie Est	0,5	4,0	5,0	4,7	65,5	9,3	76,8	1,6	14,8	0,8	45,3	1,1	101,7	32,0	243,2	98,0
Saguenay-Lac-Saint-Jean			0,0	0,0	9,0	12,0	14,5	9,7	23,0	4,2	1,0	0,0	1,7	0,2	ND	ND
Moyenne générale	0,2	2,0	6,8	3,8	59,4	12,7	60,6	9,3	39,8	2,2	59,4	1,2	44,7	5,5	69,7	17,2

*Données partielles

ND : données non disponibles

Collaboration : Jean-Philippe Légaré, biologiste-entomologiste, MAPAQ

Chaque champ est différent, et les données mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre indicatif seulement. Elles ne sont pas une justification pour nécessairement intervenir contre les cicadelles dans votre région.